

Alpina

Sinonimi: /

Sorto v tipu bele babure so ob koncu prejšnjega stoletja pri Semenarni Ljubljana vzgojili z individualno selekcijo iz sorte Soroksari. Vodena je bila pod oznako S10. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2007.

Rastlina je srednje visoka do nizka in se srednje razrašča. Listi so srednje veliki, srednje zeleni, šibko mehurjasti. Pecelj cveta je pol povešen, antere so obarvane modro. Zacveti zgodaj, dozorevanje plodov je srednje zgodno. Plod raste povešajoče, je srednje velik do majhen, pravokoten do trapezast, dolg 7 do 9 cm in na najširšem delu širok okoli 6 cm, ima pretežno 3 prekate. Površina ploda je gladka, pecelj je srednje debel, kratek in malo do srednje vdrtn. Ob muhi ima veliko plodov majhen kratko koničast podaljšek. V tehnološki zrelosti so plodovi srednje belo rumeni, z nadaljnjim dozorevanjem barva preide v rdečo. Meso ploda je srednja debelo do debelo (okoli 7 mm), plodovi so srednje težki, masa okoli 100 g pri pridelavi v zaščitenem prostoru in okoli 80 g na prostem.

Pri pridelavi sorta nima posebnih zahtev. Plodovi so srednje izenačeni, za svojo velikost razmeroma težki. V primerjavi z drugimi sortami tega tipa so pridelki pri pridelavi v tunelu nizki, na prostem pa povprečni. Sorta je kolikor bolj občutljiva za pomanjkanje Ca. Odpornosti niso znane.

Sorta je primerna za svežo porabo, za vlaganje v kis in za pripravo različnih jedi.



Botinska rumena

Sinonimi: /

Sorta iz skupine paradižnikove paprike, ki izvira iz Hrvaške. Konec 70-ih let prejšnjega stoletja so jo iz populacije, ki so jo množično pridelovali v območju okoli kraja Virovitica na SV Hrvaške ob meji z Madžarko odbrali na Zavodu za vrtnarstvo Agronomske fakultete v Zagrebu (Zavod za povrčarstvo, takratni Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilište u Zagrebu). Sorto so takrat uporabljali predvsem za kisanje v sodih. Z imenom Botinska žuta je bila v Sortno listo Jugoslavije, v takratni Seznam novo vzgojenih sort, vpisana leta 1984, takrat se je razširila tudi v Slovenijo. Sorto še vedno gojijo tudi na območju od koder izvira, saj je ena od sort, ki jih pridelujejo pod označbo geografskega porekla »virovitička paprika«. Uporabljajo jo predvsem za konzerviranje s pasterizacijo. Kasneje (ob vstopu Slovenije v EU) je bila sorta zato, ker ni imela opravljenega preverjanja RIN, iz Sortne liste izbrisana. Po uspešno opravljenem preverjanju je bila v Sortno listo Slovenije ponovno vpisana leta 2008 najprej kot ohranjevalna, od leta 2012 pa kot redno vpisana sorta.

Rastlina je srednje visoka in se bujno razrašča. Listi so srednje do temno zeleni, srednje veliki. Pecelj cveta je pol povešen, antere so obarvane modro. Zacveti srednje pozno, tudi dozorevanje plodov je srednje pozno. Plod raste vodoravno, je okrogel in nekoliko sploščen, majhen do srednje velik (premera 6 do 7 cm), blago rebrat, ima 3 do 4 prekate. Površina ploda je gladka, pecelj je kratek, zelo rahlo vdrt. V tehnološki zrelosti so plodovi mlečno rumene barve, z nadaljnjim dozorevanjem barva najprej prehaja v oranžno rdečo in nato v rdečo. Jeseni, ko se nekoliko ohladi, se lahko na svetlo rumenih plodovih pojavi rahlo vijolično obarvanje. Meso ploda je debelo (okoli 8 mm) in čvrsto, zato so plodovi glede na velikost razmeroma težki in tehtajo med 70 in 90 g. Kožica je debela.

Pri pridelavi sorta nima posebnih zahtev. Plodovi so izenačeni, za svojo velikost razmeroma težki. Odpornosti niso znane. Optimalno zreli plodovi se dobro skladiščijo.

Sorta je primerna tako za svežo rabo, še posebej priljubljena pa je za vlaganje. Ker pecelj ni vdrt, ga je skupaj s semenom lahko odstraniti. Če plodove uporabljamo za kuhane jedi, je kožico lahko odstraniti. Pri sveži papriki je okus sprva rahlo sladek, ob koncu pa nekoliko pogreni.



Eta

Sinonimi: /

Sorto sladkih feferonov so pri Semenarni Ljubljana s klonsko selekcijo vzgajali iz populacije, ki jo gojijo v okolici Leskovca v Srbiji. V Sortno listo Slovenije je bila sorta vpisana leta 2018.

Rastlina je srednje visoka do visoka. Listi so srednje veliki, srednje zeleni, šibko mehurjasti. Pecelj cveta je pol povešen, antere so obarvane modro. Zacveti srednje zgodaj, dozorevanje plodov je zgodno. Plod raste povešajoče, je majhen in oblike roga - zelo dolg (20 do 25 cm) in ukrivljen, v premeru meri le 1 do 2 cm, ima 2 prekata in ni rebrat. Površina ploda je močno nagubana, pecelj je tanek, srednje dolg do dolg in ni vdrt. V tehnološki zrelosti so plodovi svetlo zeleni, z nadaljnjim dozorevanjem barva najprej preide v oranžno in nato v svetlo do srednje rdečo. Meso ploda je zelo tanko (1 do 2 mm), plodovi so zelo lahki, tehtajo okoli 10 g .

Pri pridelavi sorta nima posebnih zahtev. V ugodnih pogojih rastline nastavijo veliko plodov, ki dozoriijo zgodaj. Odpornosti niso znane.

Sorta je primerna za svežo porabo in za vlaganje v kis.



Jerneja

Sinonimi: /

Sorto v tipu bele babure so pri Semenarni Ljubljana s klonsko selekcijo vzgojili iz populacije, ki jo gojijo v okolici Čapljin v Bosni in Hercegovini. V Sortno listo Slovenije je bila sorta vpisana leta 2014.

Rastlina je srednje visoka. Listi so temno zeleni, srednje veliki, srednje do močno mehurjasti. Pecelj cveta je pol povešen, antere so obarvane modro. Zacveti zgodaj, tudi plodovi začnejo zoreti zgodaj. Plod raste vodoravno, je trapezaste oblike, srednje velik do majhen (dolga okoli 9 cm in premera 6 do 7 cm), blago rebrat, večina plodov ima 3 prekate. Površina ploda je gladka, pecelj je kratek in srednje debel, srednje vdrta. V tehnološki zrelosti so plodovi svetlo zeleni, z nadaljnjim dozorevanjem barva preide v temno rdečo. Meso ploda je srednje debelo (okoli 6 do 7 mm) in čvrsto, plod tehta okoli 120 g.

Pri pridelavi sorta nima posebnih zahtev. Odpornosti niso znane.

Sorta je primerna svežo porabo, za vlaganje v kis in za pripravo različnih jedi.



Magdalena


Sinonimi: /

Sorto, ki je po obliki ploda široka kapija, so v začetku tega stoletja pri Semenarni Ljubljana vzgojili z individualno selekcijo iz sorte Kurtovska kapija. V Sortno listo Slovenije je bila sorta vpisana leta 2010.

Rastlina je srednje visoka. Listi so temno zeleni, srednje veliki, šibko mehurjasti. Pecelj cveta je pol povešen, antere so obarvane modro. Zacveti srednje zgodaj, tudi plodovi dozorevajo srednje zgodaj. Plod raste povešajoče, je koničast in v spodnjem delu pogosto nekoliko sploščen, srednje velik do velik (dolga okoli 16 cm in premera 6 do 7 cm), srednje rebrat, večina plodov ima 2 prekata. Površina ploda je gladka, pecelj je srednje dolg in srednje debel, zelo rahlo vdrt. V tehnološki zrelosti so plodovi temno zeleni, z nadaljnjim dozorevanjem barva preide v srednje do temno rdečo. Meso ploda je srednje debelo (okoli 5 mm) in čvrsto, plod tehtata okoli 180 g. Kožica je srednje debela do debela. V primerjavi s sorto Nataša so rastline nižje in plodovi v tehnološki zrelosti temnejši zeleni.

Pri pridelavi sorta nima posebnih zahtev. Plod je velik in mesnat.

Sorta je primerna za presno rabo, za pečenje in pripravo različnih jedi. Ker pecelj ni vdrt, ga je skupaj s semenom lahko odstraniti. Ker so deli ploda vdrti, se ne speče enakomerno, se pa kožica po peki dobro lupi.



Nataša

Sinonimi: /

Sorto, ki je po obliki ploda široka kapija, je izmed spontano nastalih križancev odbrala in nato selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila sorta vpisana leta 2019 kot vrtičkarska sorta.

Rastlina je visoka. Listi so temno zeleni, srednje veliki do veliki. Plodovi dozorevajo zgodaj. Plod raste povešajoče, je koničast in v spodnjem delu lahko nekoliko sploščen, srednje velik do velik (dolga okoli 17 cm in premera 6 do 8 cm), rebrat (zlasti v spodnjem delu), večina plodov ima 2 prekata. Površina ploda je gladka, pecelj je srednje dolg in srednje debel do debel, zelo rahlo vdrta. V tehnološki zrelosti so plodovi srednje zeleni, z nadaljnjim dozorevanjem barva preide v srednje do temno rdečo. Meso ploda je srednje debelo (okoli 5 mm) in čvrsto, plod tehta okoli 180 g. V primerjavi s sorto Magdalena so rastline višje in plodovi v tehnološki zrelosti svetleje zeleni.

Pri pridelavi sorta nima posebnih zahtev. Plod je velik in mesnat. Odpornosti niso znane.

Sorta je primerna za presno rabo in pripravo različnih jedi, primernost za pečenje ni bila preverjena. Ker pecelj ni vdrta, ga je skupaj s semenom lahko odstraniti.



Sivrija

Sinonimi: /

Sorta iz skupine rog paprike, ki po navedbah nekaterih virov (npr. D Bebler in sod., 1955) izvira iz Bolgarije. Prve omembe te sorte v virih v slovenskem jeziku zasledimo sredi prejšnjega stoletja. Priporočajo jo za vlaganje v kis (D. Bebler in sod., 1955; F. Vardjan, 1957, S. Avšič in sod., 1966). Sorta je (sicer kot Rumena Sivrija) natančno opisna v knjigi Opis priporočenih sort poljščin in vrtnin leta 1966 (S. Avšič in sod., 1966). Sredi 20. stoletja je bila sorta Sivrija na območju takratne skupne države Jugoslavije pomembna tržna sorta, kar lahko sklepamo iz tega, da je tako označena in opisana v Priročniku o kvaliteti prehrambnih proizvodov iz leta 1965 (Ljubisavljević M., 1965). Sorta je bila v Sortno listo Jugoslavije, v takratni Seznam domačih in udomačenih sort vpisana že ob sami vzpostavitvi le-te leta 1967. Kasneje (ob vstopu Slovenije v EU) je bila sorta zato, ker ni imela opravljenega preverjanja RIN, iz Sortne liste izbrisana. Po uspešno opravljenem preverjanju je bila v Sortno listo Slovenije ponovno vpisana leta 2008 najprej kot ohranjevalna, od leta 2012 pa kot redno vpisana sorta.

Rastlina je visoka in se srednje razrašča. Rast je zelo pokončna. Listi so veliki, srednje do svetlo zeleni, šibko mehurjasti. Pecelj cveta je pol povešen, antere so obarvane modro. Zacveti srednje pozno, dozorevanje plodov pa je srednje zgodno. Plod raste povešajoče, je majhen do srednje velik, dolg (okoli 20 cm) in ozek (premer 3 do 4 cm), pogosto rahlo ukrivljen, tako da pravimo da ima obliko roga, običajno ima 2 prekata. Površina ploda je nagubana, pecelj je tanek, srednje dolg do dolg in ni vdrt. V tehnološki zrelosti so plodovi svetlo zeleni do rumeno zeleni, z nadaljnjim dozorevanjem barva preide v svetlo oz. oranžno rdečo. Meso ploda je tanko (debelo 3 do 4 mm), zato so plodovi razmeroma lahki (masa okoli 60 g). Tudi kožica je tanka.

Pri pridelavi sorta nima posebnih zahtev. V ugodnih pogojih rastline nastavijo veliko plodov, ki dozoriyo srednje zgodaj. Ker so plodovi lahki, so pridelki kljub temu nizki do srednji. Odpornosti niso znane.

Sorta je primerna za svežo porabo in za vlaganje delno kuhanih plodov v kis. Za pečenje ni primerna, saj je meso tanko in tudi kožico je zelo težko odstraniti.



Soroksari

Sinonimi: /

SORTE TRENUTNO NE VZDRŽUJEJO V SLOVENIJI

Sorta v tipu bele babure izvira iz Madžarske, v Sortno listo Jugoslavije oz. v takratni Seznam tujih sort kmetijskih rastlin je bila prvič vpisana leta 1976 s čimer je bilo tej takrat novi tuji sorti, požlahtnili so jo na takratni Fakulteti za hortikulturo Univerze v Budimpešti (Kerteszeti Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem) dovoljeno pridelovanje na območju Slovenije. Kasneje se je sorta zelo razširila v pridelavi in je postala standard za papriko v tipu bele (mlečno rumene) babure. Ob vstopu Slovenije v EU je bila sorta zato, ker ni imela opravljenega preverjanja RIN, iz Sortne liste izbrisana in nato, po uspešno opravljenem preverjanju, ponovno vpisna leta 2011 kot vrtičkarska sorta.

Rastlina je srednje visoka do nizka in se srednje razrašča. Rast je pokončna. Listi so srednje veliki, srednje zeleni, šibko mehurjasti. Pecelj cveta je pol povešen, antere so obarvane modro. Zacveti srednje zgodaj, dozorevanje plodov je srednje zgodno. Plod raste povešajoče, je srednje velik do majhen, prizmatičen ali trapezast, dolg 7-9 cm in na najširšem delu širok okoli 6 cm, ima 3 do 4 prekate. Površina ploda je gladka, pecelj je srednje debel, srednje dolg do kratek in srednje vdrt. V tehnološki zrelosti so plodovi srednje do svetlo belo rumeni, z nadaljnjim dozorevanjem barva preide v oranžno rdečo. Meso ploda je srednje debelo (5 do 6 mm), plodovi so srednje težki, masa okoli 100 g pri pridelavi v zaščitenem prostoru in okoli 80 g na prostem.

Pri pridelavi sorta nima posebnih zahtev. Plodovi so srednje izenačeni. V primerjavi z drugimi sortami tega tipa so pridelki pri pridelavi v tunelu nizki, na prostem pa povprečni. Sorta je koliko bolj občutljiva za pomanjkanje Ca. Odpornosti niso znane.

Sorta je primerna za svežo porabo, za vlaganje v kis in za pripravo različnih jedi.

