

# Haloški

Sinonimi: /



Sorto so odbrali pri Semenarni Ljubljana in je bila v Sortno listo Slovenije vpisana leta 2018 kot vrtničkarska sorta.

Listi so srednje številni, pokončni do pol pokončni, srednje do temno zeleni, srednje dolgi in široki. Lažno steblo je srednje široko do široko. Cvetno steblo je srednje dolgo in ukrivljeno. Čebulica je srednje velika do velika, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti so rumenkasto beli prisotno je rdeče obarvanje, število strokov v čebulici je majhno do srednje, stroki so krožno razporejeni, zunanji stroki niso prisotni. Strok je srednje velik do velik, suha luska je rjava, meso rumenkasto. Tehnološko dozori pozno. Dormantnost strokov je srednje dolga.

Sorta je namenjena za jesensko sajenje.

Stroki so aromatični, manj ostrega okusa, primerni za svežo uporabo in kuhanje.



## Jesenski Anka

Sinonimi: /



Sorta je klonska selekcija materiala, ki ga je ga. Anka Černec, po kateri je sorta dobila ime in pri kateri je sorto dobil vzdrževalec Amarant, dobila iz Čakovca na Hrvaškem sredi 90-ih let prejšnjega stoletja. Sorta je bila v Sortno listo Slovenije vpisana leta 2011 kot vrtničkarska sorta.

Listi so srednje številni, pol pokončni, temno zeleni, srednje dolgi in široki. Lažno steblo je široko brez rdečega obarvanja. Rastlina razvije cvetno steblo. Čebulica je srednje velika, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti so beli, število strokov v čebulici je srednje, stroki so krožno razporejeni, zunanji stroki so redko so prisotni. Strok je srednje velik do velik, suha luska je rjava, meso rumenkasto. Tehnološko dozori srednje zgodaj. Dormantnost strokov je srednje dolga.

Sorta je namenjena za jesensko sajenje.

Stroki so aromatični, manj ostrega okusa, primerni za svežo uporabo in kuhanje.



## Primorski

Sinonimi: /



Sorta po svojih značilnostih ustreza populaciji istrskega česna. Da je bil česen v Slovenski Istri sredi prejšnjega stoletja pomembna kultura in da so ga pridelovali tako za merkantil kot za prodajo semenskega materiala lahko razberemo iz zapisa Andreja Briškega v prispevku Agrarna geografija Šavrinskega gričevja (1956): *»Čebulo in česen pridelujejo za takojšnjo uporabo, poleg tega tudi za seme in čebulček, ki ju prodajajo na trgu. Seveda pa ju kupujejo tudi domači kmetje.«*. Sorta je klonska selekcija Semenarne Ljubljana in je bila v Sortno listo Slovenije vpisana leta 2018 kot vrtničarska sorta.

Listi so srednje številni, pol pokončni, svetlo do srednje zeleni, srednje dolgi in srednje široki. Lažno steblo je srednje široko, zelo šibko rdeče obarvano. Cvetno steblo je kratko in ukrivljeno. Čebulica je majhna do srednja, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti so beli, število strokov v čebulici je veliko, stroki so mešano razporejeni, vsi približno enako veliki. Strok je majhen do srednji, suha luska je rožnate barve, meso rumenkasto belo. Tehnološko dozori srednje pozno. Dormantnost strokov je srednje dolga do dolga.

Sorta je primerna za sajenje jeseni ali zgodaj spomladi.

Stroki so zelo aromatični, ostrega vonja in okusa.



## Ptujski jesenski

Sinonimi: /



Sorta je klonska selekcija populacije, ki so jo pridelovali v okolici Apač na Ptujskem polju. Pri Semenarni Ljubljana so jo vzgojili v drugi polovici 70-ih let prejšnjega stoletja. V Sortno listo Jugoslavije, v takratni Seznam domačih in udomačenih sort, je bila sorta vpisana leta 1989, kasneje (ob vstopu Slovenije v EU) je bila sorta zato, ker ni imela opravljenega preverjanja RIN, iz Sortne liste izbrisana in nato, po uspešno opravljenem preverjanju ponovno vpisana leta 2008.

Listi so srednje številni, pokončni do pol pokončni, svetlo do srednje zeleni s srednje močno voščeno prevleko, srednje dolgi in srednje široki do široki. Lažno steblo je srednje široko, šibko rdeče obarvano. Cvetno steblo se ne razvije. Čebulica je srednje velika do velika, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti so rumenkasto beli in se srednje tesno prilegajo, število strokov v čebulici je srednje do majhno, stroki niso krožno razporejeni, prisotni so zunanji stroki. Strok je srednje velik, suha luska je krem barve, meso rumenkasto. Tehnološko dozori srednje pozno. Dormantnost strokov je srednje dolga.

Sorta je namenjena za jesensko sajenje.

Stroki so aromatični, manj ostrega okusa, primerni za svežo uporabo in kuhanje.





## Ptujski spomladanski

Sinonimi: /



Sorta je klonska selekcija populacije, ki so jo pridelovali v okolici Apač na Ptujskem polju. Pri Semenarni Ljubljana so jo vzgojili v drugi polovici 70-ih let prejšnjega stoletja. V Sortno listo Jugoslavije, v takratni Seznam domačih in udomačenih sort, je bila sorta vpisana leta 1989, kasneje (ob vstopu Slovenije v EU) je bila sorta zato, ker ni imela opravljenega preverjanja RIN, iz Sortne liste izbrisana in nato, po uspešno opravljenem preverjanju ponovno vpisana leta 2008.

Listi so srednje do malo številni, pol pokončni, srednje zeleni s srednje močno voščeno prevleko, kratki in ozki. Lažno steblo je srednje široko, lahko šibko rdeče obarvano. Cvetno steblo se ne razvije. Čebulica je majhna do srednja, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu eliptična, koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti so beli in se tesno prilegajo, število strokov v čebulici je veliko, stroki niso krožno razporejeni, prisotni so zunanji stroki. Strok je majhen do srednji, suha luska je krem barve, meso rumenkasto. Tehnološko dozori srednje zgodaj. Dormantnost strokov je dolga.

Sorta je primerna za sajenje jeseni ali spomladi.

Stroki so zelo aromatični, ostrega okusa in vonja.



# Štrigon

Sinonimi:

**Rjavi štrigon, Stroligo rosso, Štrigun crveni**



Sorta po svojih značilnostih ustreza populaciji istrskega česna. Da je bil česen v slovenski Istri sredi prejšnjega stoletja pomembna kultura in da so ga pridelovali tako za merkantil kot za prodajo semenskega materiala lahko razberemo iz zapisa Andreja Briškega v prispevku *Agrarna geografija Šavrinskega gričevja* (1956): *»Čebulo in česen pridelujejo za takojšnjo uporabo, poleg tega tudi za seme in čebulček, ki ju prodajajo na trgu. Seveda pa ju kupujejo tudi domači kmetje.«* Sorta je klonska selekcija, ki so jo vzdrževali na kmetiji Grižonovih v slovenski Istri in je bila v Sortno listo Slovenije vpisana leta 2015 kot vrtničarska sorta.

Listi so srednje številni, pokončni, temno zeleni, srednje dolgi do dolgi in srednje široki. Lažno steblo je srednje široko, šibko rdeče obarvano. Cvetno steblo je srednje dolgo in ukrivljeno, oblikuje zračne čebulice. Čebulica je srednje velika, nekoliko sploščena, na prečnem prerezu okrogla, koreninski disk je sploščen, suhi zunanji luskolisti so rdečkasto beli, število strokov v čebulici je srednje, stroki so krožno razporejeni, zunanji stroki niso prisotni. Strok je srednje velik, suha luska je rožnate barve, meso rumenkasto. Tehnološko dozori srednje zgodaj. Dormantnost strokov je srednje dolga.

Sorta je primerna za sajenje jeseni.

Stroki so zelo aromatični, ostrega okusa in vonja.

