

VSEBNOST BELJAKOVIN IN ASKORBINSKE KISLINE KROMPIRJEVIH SORT
PROTEIN AND ASCORBIC ACID CONTENT OF POTATO VARIETIES

SORTA VARIETY	Suha snov Dry matter g/kg	Vlaga Humidity g/kg	Beljakovine v svežem vzorcu Proteins in fresh sample g/kg	Askorbinska kislina v svežem vzorcu Ascorbic acid in fresh sample mg/100g	Beljakovine v posušenem vzorcu Proteins in dried sample g/kg	Askorbinska kislina v posušenem vzorcu Ascorbic acid in dried sample mg/100g
Actrice	144	856	16,2	8,0	96,1	47,2
Adato	209	791	19,1	14,4	72,1	54,5
Adora	166	834	15,0	8,8	75,6	44,2
Bikini	186	814	19,5	6,0	85,2	26,4
Cardinia	197	804	18,7	15,0	76,5	61,2
Carolus	190	810	18,3	7,8	77,9	33,3
Cerata	181	819	14,4	10,0	65,0	45,3
Cupido	154	846	14,1	8,7	77,3	47,6
Desiree	175	825	19,3	8,5	91,0	39,9
Electra	135	866	17,0	6,6	109,4	42,2
Everest	195	805	20,8	12,2	86,0	50,5
Fandago	175	825	14,7	3,7	69,3	17,2
KIS Sora	167	833	18,2	9,1	90,8	45,3
La Strada	154	846	19,0	12,1	104,2	66,4
Manhattan	169	831	16,7	11,8	81,9	58,0
Montreal	188	812	18,8	18,7	81,0	80,5
Rock	177	824	19,2	13,8	89,6	64,5
Sante	191	809	17,8	12,8	75,5	54,4
Torino	185	816	20,7	13,5	91,5	59,7
Montreal	161	839	19,3	13,5	100,6	70,5
Rock	165	836	18,0	17,3	91,4	87,8
Sante	170	830	18,6	13,3	90,8	65,1
Torino	190	810	22,3	16,3	95,3	69,6