

INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE POLJŠČIN**Žita**

Razvoj in zdravstveno stanje žit na območju osrednje Slovenije in Gorenjske sta različna, odvisno od območja pridelave in sorte. Ozimni ječmeni večinoma klasijo (BBCH 49-59), v nekaterih posevkih se pojavljajo znamenja okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo na drugem ali tretjem najmlajšem listu ali nižje, znamenj ječmenove ramularijske pegavosti v tem tednu še nismo opazili. Do začetka cvetenja je še zadnji čas, da zavarujete posevke pred boleznimi, v kolikor jih še niste. Preventivni pristop je še posebej pomemben pri zatiranju ječmenove ramularijske pegavosti, predvsem na lokacijah, kjer se pojavlja vsako leto, saj bolezni po pojavu znamenj ni več mogoče zatirati. V posevkih se pojavljajo tudi ličinke žitnega strgača in listne uši. Zatiranje škodljivcev opravite po potrebi, če najdete v povprečju eno ličinko strgača na vsakem steblu ali če bo z listnimi ušmi naseljenih več kot polovica klasov.

Ozimne pšenice so pretežno v stadiju od razvoja zastavičarja do začetka klasenja (BBCH 39-53). V posevkih se pojavlja predvsem pšenična listna pegavost na tretjem ali četrtem najmlajšem listu, v nekaterih sortah pšenice in tritikale na Gorenjskem smo opazili tudi znamenja žitne pepelovke. Priporočamo pregledovanje njiv. V obdobju, ko so razviti že vsi listi (od BBCH 39 dalje) je priporočljivo, da opravite škropljenje s fungicidi in tako zavarujete mlade liste pred okužbami. To še posebej velja za posevke, kjer na spodnjih listih opazate znamenja septorijske pegavosti. Padavine, ki so bile ponekod kar obilne v zadnjem tednu in so napovedane tudi v prihodnjih dneh, bodo še naprej omogočale širjenje okužb. Za nove okužbe s pšenično (septorijsko) pegavostjo je namreč potrebnih 5 do 10 mm dežja in mokro listje približno 36 ur. Za zatiranje bolezni lahko uporabite fungicide kot so **Archer max, Amistar opti, Elatus era, Opus 1, Priaxor EC, Prosaro, SegurisXtra, Zantara, Zamir** in drugi (seznam registriranih fungicidov).



Slika 1: Pšenica močno okužena s pšenično listno pegavostjo

Slika 2: Žitna pepelovka na tritikali

Slika 3: Ličinka žitnega strgača in kolonija listnih uši na ječmenu

Koruza

Koruza ima v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem v povprečju razvite tri do štiri liste. V nekaterih posevkih na Sorškem polju so se pojavile sovke, ki objedajo mlade rastline. Za njihovo zatiranje ni registriranih insekticidov.



Sliki 3 in 4: Poškodbe mladih rastlinah koruze zaradi sovke na Sorškem polju

Krompir

Večina nasadov krompirja na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji je vznikla. Rastline so velike okoli 10 cm, v nasadih pod prekrivko tudi 20 cm ali več. Na komaj vzniklih rastlinah se že pojavljajo koloradski hrošči. Priporočamo redno spremljanje razvoja škodljivcev. V primeru otoplitve vremena lahko pričakujemo zgoden pojav ličink.



Slika 6: Koloradski hrošč na komaj vzniklem krompirju

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt