

Listne uši na blitvi, špinači in solati

V posevkih blitve, špinače in v nekaterih solatah smo opazili listne uši. Napadene rastline imajo mehurjave liste, ki slabo rastejo. Za zatiranje listnih uši na listnih vrtninah lahko uporabite pripravke na osnovi piretrina kot so **Raptol koncentrat (star)**, **Raptol spray (star)** in **Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina R**. Vsi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V špinači lahko uporabite tudi **Neemazal – T/S**, v integrirani pridelavi pa še **Karate Zeon 5 CS**. Za zatiranje uši v solati je na voljo več pripravkov. V ekološki pridelavi je poleg omenjenih pripravkov na osnovi piretrina ter sredstva **Biotip Floral** dovoljen tudi **Naturalis** na osnovi *Beauveria bassiana*, v integrirani pridelavi pa še **Pirimor 50 WG**, **Actara 25 WG**, **Moksycan 20 SG** in še nekateri.



Slika 1: Kolonija črne fižolove uši na spodnji strani lista blitve.



Slika 2: Znamenja napada uši na špinači se kažejo v obliki mehurjivosti listov.

Čebulna plesen in česnova rja

Na posevkih čebule smo opazili prva znamenja čebulne plesni. Vremenske razmere so sedaj ugodne za razvoj in širjenje bolezni, zato priporočamo, da rastline zavarujete s fungicidom. Uporabite lahko pripravek **Ridomil gold MZ pepite** ali **Penncozeb 75 DG** ali katerega od registriranih **bakrovih pripravkov**.

Na česnu se je ponekod začela pojavljati česnova rja. Priporočamo pregledovanje nasadov. V primeru pojava bolezni lahko preprečite širjenje bolezni po nasadu s sredstvi kot so **Luna Experience**, **Mirador 250 EC**, **Ortiva** ali **Zaftra AZT 250 EC**.

Solatna plesen

Trenutne vremenske razmere z veliko vlage so ugodne tudi za razvoj solatne plesni (*Bremia lactucae*). Bolezen se hitreje razvija v gostih sestojih in slabo zračnih razmerah, zato je pomemben preventivni ukrep primerna gostota posevka, redno odstranjevanje plevela in zmerno gnojenje. Bolezen se najprej kaže v obliki rumenih peg na zgornji strani lista (slika 4), na spodnji strani se pojavi bela plesniva prevleka (slika 5). Za zatiranje bolezni lahko na prostem in v zavarovanih porostorih uporabite naslednja sredstva: **Amylo-X, Revus, Zaftra AZT 250 SC, Mirador 250 SC, Ortiva**; samo na prostem **Cuprblau Z 35 WG, Enervin, Gett, Infinito, Pergado MZ, Polyram DF, Ridomil Gold MZ Pepite**; izključno v zavarovanih prostorih pa **Previcur Energy**.



Slika 4: Rumene pege na berivki, kot posledica okužbe z glivo, ki povzroča solatno plesen.



Slika 5: Bela plesniva prevleka na spodnji strani lista solate je vzrok solatne plesni.

Pegavosti na listih rdeče pese in blitve



Na blitvi in rdeči pesi so se začele pojavljati listne pegavosti – okroglaste, rjavo sive pege, obrobljene z rdečim ali temno rjavim robom. Pegi so neenakomerno razporejeni po listni ploskvi in se začnejo združevati, ko bolezen napreduje. Povzročata jih glivi *Cercospora beticola* in *Ramularia beticola*. Priporočamo pregledovanje njiv. Za omejevanje okužb v rdeči pesi posevke poškopite s katerim od sledečih fungicidov: **Mavita 250 EC, Mirador 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Sphere 535 SC** ali **Zaftra AZT 250 SC**. Na posevkih blitve odstranjujte okužene liste.

Sliki 6 in 7: Listna pegavost na rdeči pesi in na blitvi.

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt