

29. marec 2021

OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V ŽITIH

Tabela: Herbicidi za zatiranje plevelov v žitih (iz baze FFS, marec 2021)

Pripravki aktivna snov	Odmerek (kg, l/ha)	Registracija in čas rabe P-pšenica, J-ječmen, JJ-jari ječmen, Pi-pira, O-oves, R-rž, T-tritikala	Pleveli
Adentis, Corida, Flame, TBM 75 WG tribenuron-metil	0,02	P, J od prvega kolence in najpozneje do faze zastavičarja (BBCH 31-39)	Enoletni širokolistni pleveli; ko so v fazi intenzivne rasti in imajo razvit šesti list
Alister new diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	1	P zgodaj spomladi, v razvojnem stadiju od dveh listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)	Njivski lisičji rep in širokolistni pleveli
Alliance diflufenican + metsulfuron metil	0,1	P, J po vzniku, od prvega lista do konca razraščanja (BBCH 10-29)	Enoletni širokolistni pleveli
Ally SX, Finy, Savvy metsulfuron-metil	0,03	P, J, Pi, O, R, T v jarih ž.: od drugega lista do zastavičarja (BBCH 12-39); v oz. ž. od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21- 39)	Enoletni širokolistni pleveli
Atlantis star jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon-metil	0,2 - 0,33	P, T od treh listov do drugega kolence (BBCH 13-32)	Enoletni ozkolistni in nekateri širokolistni pleveli
Axial pinoksaden	0,6 - 1,2	P, J od treh listov do zastavičarja (BBCH 13-39)	Enoletni ozkolistni pleveli, ko so v razvojni fazi od 1-6 listov ali ko imajo razvita 3-4 kolence.
Axial one florasulam + pinoksaden	1 - 1,3	P, J od prvega lista do faze, ko je viden zastavičar (BBCH 11-37)	Nekateri širokolistni in ozkolistni pleveli
Basagran 480 bentazon	2,0	P, J, O, R, T od razraščanja do začetka kolenčenja (BBCH 21-31)	Nekateri širokolistni pleveli
Biathlon 4D florasulam + tritosulfuron	0,07	P, J, Pi, R, T od tretjega lista do razvitega zastavičarja (BBCH 13 do 39)	Enoletni in večletni širokolistni pleveli
Boudha metsulfuron + tribenuron	0,02	P, J, R, T (oves: manjše uporabe) od začetka razraščanja in najpozneje do faze zastavičarja (BBCH 21-39)	Enoletni širokolistni pleveli
Bonaca, Flurostar 200, Starane forte,	0,6 - 0,8	P, J, R, T od dveh razvitih listov do	Enoletni širokolistni in nekateri večletni širokolistni pleveli

Tandus 200, fluroksipir		zastavičarja (BBCH 12-39)	
Clyde FX florasulam + fluroksipir	1,5	P, J, O, R, T od faze šest stranskih poganjkov in najdlje do stopnje zastavičarja (BBCH 26-39)	Enoletni in večletni širokolistni plevli
Corello duo florasulam + piroksulam	0,170 - 0,265	P, Pi, R, T od začetka razraščanja do faze prvega kolena (BBCH 21-31)	Ozkolistni in širokolistni plevli
Duplosan KV, mekoprop – P	2,0	P, J, od razraščanja do kolenčenja (BBCH 21-31)	Širokolistni plevli; tretirati pri temperaturah zraka višjih od 12°C, oz. razmerah, ki pospešujejo rast posevka (toplota, vlaga).
Duplosan KV 600 mekoprop – P	1,5	P, J, O, R, T med razraščanjem žit (BBCH 13-29)	
Ergon metsulfuron-metil + tifensulfuron-metil	0,06-0,07	P, JJ od razvitih dveh listov do faze zastavičarja (BBCH 12-39);	Enoletni in večletni širokolistni plevel
Emcee MCPA	1,0	P, J, O, R, T Jara ž.: od treh listov do drugega kolena (BBCH 13 - 32) Oz. ž.: od prvega kolena do zastavičarja (BBCH 31 - 39)	Širokolistni plevli; v času tretiranja naj bodo plevli v zgodnjih razvojnih fazah in aktivno rastoči.
Esteron 2,4-D 2-EHE	0,75 - 1,0	P, J, T Od konca razraščanja do drugega kolena (BBCH 22-32)	Enoletni širokolistni plevli
Grodyl amidoflufuron	0,04	P, J, Pi, O, R, T od treh listov do začetka pojavnja zgornjega lista (BBCH 13-37)	Širokolistni plevli
**Granstar super 50 SX tifensulfuron-metil + tribenuron-metil	0,06	P, J, O, R, T od faze, ko imajo žita razvitih 7 listov, do drugega kolena (BBCH 17 do 32)	Širokolistni plevli **zaloge v uporabi do 31.7.2021
Herbocid XL 2,4-D	1,25	P, J, R, T od sredine razraščanja do konca razraščanja (BBCH 24-29)	Enoletni in večletni širokolistni plevli
Hussar OD jodosulfuron	0,1	P, J, R, T Oz. ž.: od začetka razraščanja do zgornjega lista (BBCH 21 do 37); jara ž.: od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 13 do 29)	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni ter nekateri večletni širokolistni plevli; Najboljše delovanje, ko je ozkolistni pl. v fazi dveh listov in do konca razraščanja, in širokolistni pl. v fazi 2 - 6 listov.
Hussar plus jodosulfuron + mezosulfuron	0,2	P, J, R, T od faze treh listov do drugega kolena	Enoletni širokolistni in ozkolistni plevli; Najboljše delovanje, ko imajo širokolistni pl. 2–4 liste, ozkolistni pl. pa od začetka do

		(BBCH 13–32).	sredine razraščanja.
Lector delta diflufenikan + florasulam	0,075 - 0,1	P, J, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni pleveli
Mustang 306 SE 2,4 D + florasulam	0,4 - 0,6	P, J, T od začetka razraščanja do prvega kolenca (BBCH 21-31)	Enoletni širokolistni pleveli
Mustang forte 2,4 D + aminipirid + florasulam	0,8 - 1,0	P, J, O, R, T od začetka razraščanja do drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni pleveli; ko imajo 2-6 listov
Pallas 75 WG piroksulam	0,12 - 0,25	P, R, T od faze dveh listov do drugega kolenca (BBCH 12-32)	Ozkolistni in širokolistni pleveli
Quelex flurasulam + halauksifen-metil	0,05	P, J, Pi, R, T spomladi od faze začetnega razraščanja do faze drugega kolenca (BBCH 21-32)	Širokolistni pleveli
Sekator OD amidosulfuron + jodosulfuron	0,15	P, J, R, T oz. ž.: od tretjega lista do začetka razvoja zgornjega lista (BBCH 13-37); jara ž.: od tretjega lista do konca razraščanja (BBCH 13-29)	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli ter nekatere vrste večletnega širokolistnega plevela
Xanadu bensulfuron metsulfuron	0,1	P, J, O, R, T oz. ž. : od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21-39); jara ž.: od tretjega lista do zastavičarja (BBCH 13-39)	Enoletni širokolistni pleveli; najboljše rezultate se doseže, če se tretira majhne aktivno rastoče plevle.

P-pšenica, J-ječmen, JJ-jari ječmen, Pi-pira, O-oves, R-rž, T-tritikala

Pred škropljenjem natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Kmetijski inštitut Slovenije