

KGZS - Zavod Novo mesto

KGZS - Zavod Ljubljana

PREDIKAT

20. 3. 2016

Tehnološko navodilo 2/2016 – maline

1. Poglejte vsebino tehnoloških navodil 1/2016
2. Glivi, ki povzročata malinovo sušico, vstopata v rastlino skozi rane. Pri pregledu stanja na terenu smo ugotovili veliko poškodovanih poganjkov, ki so nastali zaradi različnih vzrokov:
 - Poškodbe poganjkov zaradi ubodov malinove hrčice in malinove hrčice šiškarice ter ostalih žuželk (rogati bivolček, ...)
 - Poškodbe zaradi toče
 - Poškodbe od košnje s koso na nitko (»laksarca)
 - Poškodbe na stiku poganjka s folijo oziroma plastificirano pokrivno folijo (ob tesnem stiku poganjka s folijo oziroma agrotekstilom)
 - Pokanje povrhnjice (skorje) poganjkov ob bujni rasti
 - Poškodbe od vezenja in žice

Priporočamo, da se v nasadu malin tudi izogibate delu, s katerim povzročate poškodbe poganjkov. Preglejte nasade in v primeru zajedanja tkanine v poganjek takoj razširite odprtine.

3. V nasadih enkrat rodni malin pregledajte poganjke na prisotnost hrčice šiškarice (odebelitve na poganjkih). To storite tudi v dvakrat rodni malinah, če ste jih pustili za obiranje drugega pridelka. Napadene poganjke izrežite in odnesite iz nasada ter sežgite.
4. Redčite odvečne poganjke. V enkrat rodni malinah poganjke redčimo do sredine maja. V višje ležečih nasadih poganjkov ne redčimo ali le krajši čas. Na tekoči meter pustimo od 8 do 12 poganjkov. V dvakrat rodni malin redčimo poganjke na približno 12 do 15 poganjkov. Poganjke odstranjujemo s škarjami.
5. V nasadu ves čas izvajajte kontrolo zdravstvenega stanja in sproti odstranjujete obolele poganjke.
6. Prilagamo seznam sredstev za varstvo rastlin, ki so dovoljena na dan 9. marec 2016. Sredstva uporabljajte le če so potrebni škodljivi organizmi, nikoli brez vzroka. Mnoga sredstva imajo dovoljenje za uporabo samo na odprtem, ni pa dovoljena njihova uporaba v tunelih.

7. V zunanjih nasadih svetujemo redno varstvo (7 – 10 dni) z sredstvi, ki zaviralno delujejo na sušico (v začetku bakrena sredstva (labicuper in coptrel, v nadaljevanju izmenjaje ostala sredstva iz priložene tabele)
8. Priporočamo, da v nasad obesite bele lepljive plošče za spremljanje oziroma manjšanje populacije malinove hrčice.
9. Pred cvetenjem maline potrebujejo največ hranil, zato ne pozabite na gnojenje v skladu z gnojilnim načrtom. V tem času priporočamo tudi dognojevanje preko listov.
10. Ob večjih temperaturnih nihanjih listi malin spremenijo barvo (porumenijo ali pordečijo). Po ustalitvi vremenskih razmer, postanejo normalno obarvani. Ob stresnih dejavnikih je priporočljiva uporaba sredstev za krepitev rastlin.

11. FFS IN UPORABA

V tabeli Dovoljena sredstva za varstvo rastlin v nasadih malin so navedena sredstva in mesto uporabe: zunaj in v zaščitenem prostoru, Podatki so povzeti iz spletne strani FITO – INFO. Pri sredstvu signum so pri podjetju ugotovili, da je na spletni strani sredstvo narobe deklarirano za uporabo v nasadih jagod in je sredstvo dovoljeno za uporabo zunaj in znotraj pokritih prostorov oziroma rastlinjakov. V izogib podobnim napakam, vedno natančno preverite sredstvu priloženo navodilo za uporabo, ki je trenutno najbolj verodostojni napotek, če ffs še ni potekel rok trajanja.

Pripravila skupina za pridelavo jagodičja