

Ameriški

Sinonimi: /



Sorto neznanega izvora na Vrtnarstvu Flajšman na Celjskem vzdržujejo od začetka tega stoletja V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2018 kot vrtničarska sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in srednje visoka do visoka. Listi so dvojno pernato deljeni, veliki, svetlo do srednje zeleni in pol povešeni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Rastline zacvetijo srednje zgodaj, tudi plodovi začnejo zoreti srednje zgodaj. Plod je rdeč, velik do zelo velik, srčast do pravokoten, ob peclju blago rebrat, s srednje izraženim zelenim/rumenim obročem, pogoste so manjše zvezdaste in krožne razpoke okoli peclja. Muha je velika. Pecelj je srednji do dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena, tanka. Na otip je plod mehak. Meso je intenzivno rdeče, skoraj v celoti zapolnjuje plod, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek (4-6 mm), semena je malo, v nekaterih plodovih nič, stržen peclja je plitev.

Plodovi so manj izenačeni (velikost in oblika), mehki, zato jih moramo obirati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Odpornosti niso znane.

Plodovi so zelo mesnati, kožica zrelih plodov se lahko lupi. Primerni so za presno uporabo in pripravo omak.



Begunec

Sinonimi: /



Po informacijah prijaviteljev sorta izvira iz Spodnje Avstrije od koder so jo s seboj prinesli povratniki iz begunstva. V Vipavski dolini (območje Šempasa) naj bi bila populacija prisotna že več kot 90 let. Sorto sta selekcionirala Jože Osvald in Marija Kogoj Osvald. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2015 kot vrtničarska sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in visoka, bujna. Listi so enojno pernato deljeni («krompirjev list»), veliki, svetlo do srednje zeleni in vodoravni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Plodovi začnejo zoreti pozno. Plod je rdeč, srednje velik do velik, ploščato okrogel, nekoliko nepravilen, ob peclju srednje rebrat, z blago izraženim ali brez zelenega obroča, lahko se pojavijo manjše zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je velika. Pecelj je srednje dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena. Na otip je plod mehak. Meso je rdeče in zapolnjuje $\frac{3}{4}$ notranjosti ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek do srednje debel (okoli 6 mm), semena je malo do srednje, stržen peclja je srednje globok.

Plodovi so srednje izenačeni (velikost), mehki, zato jih moramo obrati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Odpornosti niso znane.

Plod je sočen in mesnat, okus harmoničen. Plodovi so primerni predvsem za presno uporabo.



Bon Pierre

Sinonimi: /



Sorto so iz populacije, ki jo gojijo v Vojvodini, selekcionirali pri Semenarni Ljubljana. V času selekcije so sorto vodili pod oznako SP 1000. V Sortno listo Slovenije je bila sorta vpisana leta 2010.

Rastlina je indeterminantne rasti in srednje visoka. Listi so dvojno pernato deljeni, srednje veliki, srednje zeleni in pol povešeni glede na steblo. Socvetje je bodisi razvejano bodisi ne. Rastline pozno zacvetijo, plodovi začnejo zoreti srednje pozno. Plod je rdeč, srednje velik do velik, ploščato okrogel, ob peclju srednje rebrat, z blago izraženim zelenim/rumenim obročem, pogoste so zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je srednje velika. Pecelj je srednje dolg in se loči od rastline. Na otip je plod srednje čvrst. Meso je svetlo do srednje rdeče in zapolnjuje dobro polovico notranjosti ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je srednje debel (6-8 mm), semena je malo do srednje, stržen peclja je plitev.

Plodovi so srednje izenačeni, kožica pogosto poka. Odpornosti niso znane.

Okus je harmoničen. Plodovi so primerni za presno uporabo in pripravo omak.



Dule

Sinonimi: /



Sorto je odbrala in nato selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2014 kot vrličarska sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in nizka do srednje visoka. Listi so dvojno pernato deljeni, veliki, srednje zeleni. Socvetje je večinoma razvejano. Plodovi začnejo zoreti zgodaj. Plod je rdeč, srednje velik do velik, sploščen, ob peclju rebrat, z srednje izraženim zelenim obročem, pogoste so (tudi globlje) zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je velika, pecelj je kratek do srednje dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena, tanka in hitro počí. Na otip je plod mehak do srednje čvrst. Meso je svetlo do srednje rdeče in zapolnjuje okoli polovico ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek (okoli 6 mm), semena je malo, stržen peclja je plitev do srednje globok.

Sorta je primerna predvsem za pridelavo v zaščitenih prostorih. Plodovi so srednje izenačeni (velikost). Odpornosti niso znane.

Plodovi so sočni in srednje mesnati, primerni predvsem za presno uporabo.



Ela

Sinonimi: /



Sorto je izmed križancev sort Lila in Meri odbrala in nato selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2017 kot ohranjevalna sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in zelo visoka. Listi so enojno pernatno deljeni (»krompirjev list«), veliki, temno zeleni in povešeni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Plod je svetlo rumen ob muhi rahlo rdeč, sploščen, ob peclju rebrat, brez ali z blago izraženim zelenim obročem, pogoste so zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je velika. Pecelj je kratek do srednji in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena. Na otip je plod zelo mehak. Meso je svetlo rumeno, ob zunanjem robu lahko lokalno rdeče obarvano, zapolnjuje dobro polovico notranjosti ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek do srednje debel (5-7 mm), semena je srednje veliko, stržen peclja je plitev.

Plodovi sorazmeroma izenačeni, zelo mehki, zato jih moramo obirati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Odpornosti niso znane.

Plodovi so sočni, okus je neizrazit, skoraj brez kislin. Plodovi so primerni predvsem za presno uporabo.



Jani pritlikav

Sinonimi: /



Sorto so iz sadik, ki so jih konec prejšnjega stoletja dobili iz Madžarske, odbrali in nato selekcionirali na kmetiji Javornikovih v Sostrem pri Ljubljani. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2011 kot vrtničarska sorta.

Rastlina je determinantne rasti in na glavnem stebalu razvije 4 do 6 socvetij. Listi so dvojno pernato deljeni, srednje veliki, temno zeleni in vodoravni glede na steblo. Socvetje večinoma ni razvejano. Plodovi začnejo zoreti zgodaj. Plod je rdeč, majhen, ploščato okrogel, ni rebrat, zelenega obroča večinoma nima, pogoste so manjše zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je majhna. Pecelj je srednje dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena, tanka in hitro počí. Na otip je plod mehak. Meso je rdeče in zapolnjuje okoli polovico notranjosti ploda, ki ima 4 do 6 prekatov, perikarp je tanek (4-6 mm), semena je srednje veliko, stržen peclja je plitev.

Sorta paradižnika zaključene rasti, zato pinciranje ni potrebno. Plodovi so izenačeni, zelo mehki, zato jih moramo obrati sproti in nežno ter jih pazljivo zlagati v embalažo. Kožica pogosto poka. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Odpornosti niso znane.

Plodovi so sočni, manj do srednje mesnati, primerni predvsem za presno uporabo.



Lila

Sinonimi: /



Sorto je iz populacije debeloplodnega paradižnika, ki so jo več desetletij vzdrževali na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora, odbrala in nato selekcionirala Ljudmila Koren. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2015 kot vrtničarska sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in zelo visoka. Listi so enojno pernato deljeni (»krompirjev list«), veliki, srednje do temno zeleni in vodoravni do pol povešeni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Plodovi začnejo zoreti pozno. Plod je malinasto rdeč, velik, sploščen, ob peclju močno rebrat, s srednje izraženim zelenim obročem, pogoste so manjše zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je zelo velika. Pecelj je srednje dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je brez barve, tanka in hitro počí. Na otip je plod zelo mehak. Meso je rdeče in skoraj v celoti zapolnjuje notranjost ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek (4-6 mm), semena je zelo malo, stržen peclja je plitev.

Plodovi so razmeroma izenačeni, zelo mehki in občutljivi na odtiske, zato jih moramo obrati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Kožica pogosto poka. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Odpornosti niso znane.

Plodovi so zelo mesnati, okus je neizrazit. Plodovi so primerni za presno uporabo in za pripravo omak.



Luka

Sinonimi: /



Sorto je odbrala in nato selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2014 kot vrtničarska sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti, zelo visoka in bujna. Listi so dvojno pernato deljeni, srednje veliki, srednje do temno zeleni in pol povešeni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Plodovi začnejo zoreti pozno. Plod je rdeč, srednje velik do majhen, bolj ali manj podolgovat (narobe jajčasta ali cilindričen ali visoko okrogel), ob peclju zelo blago rebrat, običajno z močno izraženim zelenim/rumenim obročem. Muha je zelo majhna. Pecelj je dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena. Na otip je plod srednje čvrst do čvrst. Meso je svetlo rdeče in zapolnjuje le slabo četrtino notranjosti ploda, ki 4 do 6 prekatov, perikarp je tanek do srednje debel (okoli 6 mm) in neenakomerno obarvan, semena je srednje veliko, stržen peclja je plitev.

Plodovi so po obliki precej variabilni. Odpornosti niso znane.



Maribor

Sinonimi: /



Sorto že več desetletij vzdržujejo na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2015 kot vrtičarska sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in srednje visoka. Listi so dvojno pernatno deljeni, srednje do temno zeleni. Plodovi začnejo zoreti srednje zgodaj. Plod je rdeč, srednje velik do velik, sploščen, ob peclju močno rebrat, z blago izraženim zelenim/rumenim obročem, pogoste so zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je velika. Pecelj je kratek do srednje dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena, tanka in hitro počí. Na otip je plod mehak. Meso je srednje rdeče in zapolnjuje okoli $\frac{3}{4}$ ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek (okoli 4 mm), semena je malo do srednje, stržen peclja je srednje globok do globok.


Debeloplodna sorta, plodovi so srednje izenačeni, zelo mehki, zato jih moramo obirati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Kožica pogosto poka. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Odpornosti niso znane.

Sočni in mesnati plodovi. Okus je srednje izrazit. Plodovi so primerni za presno uporabo in za pripravo različnih omak.



Meri

Sinonimi: /



Sorto je iz populacije z rumenimi plodovi odbrala in nato selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2017 kot ohranjevalna sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in visoka. Listi so dvojno pernato deljeni, veliki, temno zeleni in povešeni glede na steblo. Socvetje je bodisi razvejano bodisi ne. Plod je temno rumen, srednje velik do velik, ploščato okrogel, ob peclju zelo rahlo rebrat, brez ali z blago izraženim zelenim obročem, pogoste so manjše krožne razpoke okoli peclja. Muha je srednje velika. Pecelj je kratek do srednje dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena, tanka in hitro počí. Na otip je plod zelo mehak. Meso je rumeno v sredini ploda pogosto rahlo rdeče, plod ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek (4-6 mm), sredina ploda je srednje izpolnjena z mesom, semena je srednje veliko, stržen peclja je zelo plitev.

Plodovi so izenačeni, zelo mehki, zato jih moramo obirati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Kožica pogosto poka. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Odpornosti niso znane.

Plodovi so sočni, okus je neizrazit, skoraj brez kislin. Plodovi so primerni predvsem za presno uporabo.



Milka

Sinonimi: /



Sorto že več desetletij vzdržujejo na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora, včasih naj bi jo imenovali rani Rozista. O sorti Resista v knjigi Pridelujmo več dobre zelenjadi C. Jegliča (1941) piše: *»Resista (Immun) je novejša sorta nizke jedrnate rasti, ki ostane polovico nižja od drugih sort; zato se na bolj suhih legah lahko pusti brez opore. Zori zgodaj, temnozeleno listje je odporno proti boleznim.«*. Resista je omenjena tudi v knjigi Več zelenjave več zdravja D. Bebler in soavtorjev (1955): *»Najzgodenjši je nizki in zastavni resista katerega plodovi niso posebno debeli.«*. Sredi 20. stoletja je bila ta sorta na območju takratne skupne države Jugoslavije pomembna tržna sorta, kar lahko sklepamo iz tega, da je opisana v Priročniku o kvaliteti prehranskih proizvodov iz leta 1965 (M. Ljubisavljević, 1965): *»Imun ima okrogle, malo sploščene in rebraste ter mesnate plodove s svetlo rdečo kožico. Povprečna masa ploda je 50 g. Sodi med rane sorte primerne za pridelavo v toplih gredah.«*. Vsi navedeni opisi so skladni z lastnostmi sorte Milka, ki je bila v Sortno listo Slovenije vpisana leta 2014 kot vrtničarska sorta.

Med ljubiteljskimi pridelovalci v Sloveniji je sorta znana tudi kot Čokec.

Rastlina je indeterminantne rasti in nizka. Listi so dvojno pernato deljeni, srednje veliki do majhni, zelo temno zeleni. Socvetje ni razvejano. Plodovi začnejo zoreti zgodaj. Plod je rdeč, majhen, ploščato okrogel, ob peclju nekoliko rebrat, brez zelenega obroča. Muha je zelo majhna. Pecelj je kratek in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena, tanka in hitro počí. Na otip je plod srednje čvrst. Meso je srednje rdeče in le v slabi četrtini zapolnjuje notranjost ploda, ki ima 4 do 6 prekatov, perikarp je srednje tanek (okoli 5 mm), semena je srednje veliko do veliko, stržen peclja je plitev.

Rastline so zelo čokate in robustne rasti ter dobro obstojne. Po informacijah vzdrževalke zalistnikov ni potrebno trgati. Kljub temu da so rastline nizke, v ugodnih pogojih pridelave potrebujejo oporo. Plodovi so srednje izenačeni, srednje čvrsti. Kožica pogosto poka. Odpornosti niso znane.

Plod je sočen, okus neizrazit. Plodovi so primerni za presno uporabo in za konzerviranje.



Novosadski jabučar

Sinonimi: /



Sorta v starejših virih v slovenskem jeziku ni omenjena, jo pa omenja strokovna literatura po letu 1980 (npr. V. Bajec, 1988, M. Černe, 1988, A. Đokić, 1988), čeprav je bila v Sortno listo Jugoslavije, v takratni Seznam domačih in udomačenih sort, vpisana že ob sami vzpostavitvi le-te leta 1967. Kasneje (ob vstopu Slovenije v EU) je bila sorta zato, ker ni imela opravljenega preverjanja RIN, iz Sortne liste izbrisana. Po uspešno opravljenem preverjanju je bila v Sortno listo Slovenije ponovno vpisana leta 2008 najprej kot ohranjevalna, od leta 2011 pa kot vrtničarska sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in visoka. Listi so dvojno pernato deljeni, srednje veliki, temnozeleni in pol povešeni glede na steblo. Socvetje je bodisi razvejano bodisi ne. Plodovi začnejo zoreti pozno. Plod je rdeč, srednje velik do velik mase 120 do 150 g, ploščato okrogel do okrogel, ob peclju lahko rahlo rebrat, z blago do srednje izraženim zelenim obročem. Muha je srednje velika. Pecelj je srednje dolg in se loči od rastline. Na otip je plod mehak do srednje čvrst. Meso ploda je intenzivno rdeče zapolnjuje koli polovico notranjosti ploda, ki ima 5 ali več prekatov, semena je srednje veliko, perikarp je tanek (okoli 5 mm), stržen peclja je plitev.

Plodovi so srednje izenačeni. Odpornosti niso znane.

Plod je sočen in harmoničnega okusa. Plodovi so primerni predvsem za presno uporabo.



Saša

Sinonimi: /



Sorto je selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2017 kot ohranjevalna sorta.

Sorto je selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo R Slovenije je bila vpisana leta 2017 kot ohranjevalna sorta.

Rastlina je determinantne rasti, razvije 8 do 10 socvetij. Listi so dvojno pernato deljeni, veliki, srednje do temno zeleni in pol povešeni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Plod je rdeč, srednje velik do velik, ploščato okrogel, ob peclju blago do srednje rebrat, z blago do srednje izraženim rumenim obročem. Muha je velika. Pecelj je srednje dolg in se ne loči od rastline. Kožica ploda je rumena. Na otip je plod srednje čvrst do čvrst. Meso je srednje rdeče in zapolnjuje $\frac{3}{4}$ ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek do srednje debel (5-7 mm), semena je malo, stržen peclja je plitev. Sorta se od podobne sorte Ace 55 VF razlikuje po tem, da razvije 1 do 2 socvetij na rastlino manj, da list raste manj povešeno in da je plod bolj čvrst.

Plodovi so razmeroma izenačeni. Kljub determinantni rasti rastlina potrebuje oporo, saj doseže okoli 1 m. Ker se pecelj ne loči od rastline, je plodove pri obiranju potrebno rezati. Odpornosti niso znane.

Okus je harmoničen. Plodovi so primerni tako za presno uporabo kot za predelavo.



Stanko

Sinonimi: /



Sorto že več desetletij vzdržujejo na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2014 kot vrtničkarska sorta.

Sorto že več desetletij vzdržujejo na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo R Slovenije je bila vpisana leta 2014 kot vrtničarska sorta. **Sorta je v tipu sorte Volovsko srce**

Rastlina je indeterminantne rasti in srednje visoka do visoka. Listi so dvojno pernato deljeni, svetlo do srednje zeleni in povešeni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Plodovi začnejo zoreti zgodaj. Plod je malinasto rdeč, srednje velik, srčast, ob peclju nekoliko rebrat, z blago izraženim zelenim/rumenim obročem. Muha je srednje velika. Pecelj je kratek do srednji in se loči od rastline. Kožica ploda je prozorna, tanka in hitro počí. Na otip je plod zelo mehak. Meso je malinasto rdeče in skoraj v celoti zapolnjuje notranjost ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek (okoli 5 mm), , semena je zelo malo, stržen peclja je srednje globok.

Sorta v tipu volovskega srca. Rastline so nekoliko neizenačene po višini in velikosti plodov, na rastlini so plodovi srednje izenačeni. Plodovi so zelo mehki, zato jih moramo obirati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Kožica pogosto poka. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Listi se zvijajo. Sorta je občutljiva za črno listno pegavost paradižnika, zato moramo že pri vzgoji sadik paziti, da rastlin ne močimo in da sadike ne rastejo preveč gosto, saj se v gostih posevkih zadržuje več vlage. Odpornosti niso znane.

Plod je zelo sočen in mesnat Okus je neizrazit. Plodovi so primerni predvsem za presno uporabo.



Tomi

Sinonimi: /



Sorto, je izmed spontano nastalih križancev debeloplodnega paradižnika odbrala in nato selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2014 kot vrtničarska sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in visoka ali srednja. Listi so dvojno pernato deljeni, srednje do temno zeleni in pol povešeni do vodoravni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Plodovi začnejo zoreti zgodaj do srednje. Plod je rdeč, srednje velik do velik, kvadratast do široko hruškast, močno rebrat, z blago do srednje izraženim zelenim obročem, pogoste so zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je majhna. Pecelj se ne loči od rastline. Kožica ploda je rumena. Na otip je plod mehak do srednje čvrst. Meso je svetlo rdeče in zapolnjuje le okoli $\frac{1}{4}$ ploda, ki ima 5 ali več delno votlih prekatov (brez želatinastega tkiva), perikarp je tanek (okoli 5 mm) in neenakomerno obarvan, semena je malo, stržen peclja je srednje globok.

Rastline so nekoliko neizenačene po višini in zgodnosti dozorevanja plodov. Ker se pecelj ne loči od rastline, je plodove pri obiranju potrebno rezati. Plodovi so izenačeni, srednje čvrsti. Sorta je bolj občutljiva za pomanjkanje Ca. Odpornosti niso znane.

Plod je manj mesnat in manj sočen, okus je nekoliko sladek. Plodovi so primerni predvsem za presno rabo in, ker so votli, za polnjenje.



Val

Sinonimi: /

ZAVAROVANA



Sorto so pri Semenarni Ljubljana konec 90-ih let prejšnjega stoletja odbrali iz stare sorte Volovsko srce, ki so jo sicer pri nas pridelovali že pred II. svetovno vojno. Sprva je bila sorta poimenovana Valentin. V Sortno listo Slovenije je bila sorta vpisana leta 1999.

Rastlina je indeterminantne rasti, raste srednje hitro, je srednje bujna, intenzivnost nastavljanja stranskih poganjkov je srednja do šibka. Listi so dvojno pernato deljeni, srednje veliki, srednje zeleni in rastejo pol povešeno glede na steblo. Socvetje je močno razvejano. Rastline zgodaj zacvetijo, tudi plodovi začnejo zoreti zgodaj. Plod je srednje velik, težak od 100 do 180 g. Oblika je srčasta, zunanja barva pa malinasto rdeča. Ob peclju ima plod izražen zelen/rumen obroč, pogoste so tudi zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je velika. Pecelj je srednje dolg in se loči od rastline. Kožica ploda je prozorna, tanka in hitro počí. Na otip je plod srednje čvrst. Meso je malinasto rdeče in skoraj povsem zapolnjuje notranjost ploda, ki ima več kot 6 prekatov, perikarp je tanek (debel okoli 5 mm) semena je zelo malo, stržen peclja je srednje globok.

Sorta v tipu volovskega srca. Plodovi so srednje izenačeni. Plod je zelo občutljiv na odtiske, zato moramo plodove obirati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Ker se pecelj ne loči od rastline je plodove pri obiranju potrebno rezati. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Listi se zvijajo. Sorta je občutljiva za črno listno pegavost paradižnika, zato moramo že pri vzgoji sadik paziti, da rastlin ne močimo in da sadike ne rastejo preveč gosto, saj se v gostih posevkih zadržuje več vlage. Odpornosti niso znane.

Plod je sočen in mesnat, okus je harmoničen in srednje izrazit. Plodovi so primerni predvsem za porabo v svežem stanju, lahko pa tudi za pripravo različnih omak, saj se mesnati plodovi ob kuhanju hitro razpustijo, a so omake bolj vodene.



Vesna

Sinonimi: /



Sorto je iz populacije z oranžnimi in rumenimi plodovi odbrala in nato selekcionirala Ljudmila Koren na ekološki kmetiji Koren v Radvanju na južnem robu Maribora. V Sortno listo Slovenije je bila vpisana leta 2017 kot ohranjevalna sorta.

Rastlina je indeterminantne rasti in zelo visoka. Listi so dvojno pernato deljeni, veliki, temno zeleni in pol povešeni glede na steblo. Socvetje je večinoma razvejano. Plod je oranžen, srednje velik do velik, ploščato okrogel, ob peclju srednje rebrat, z blago izraženim zelenim obročem, pogoste so manjše zvezdaste razpoke okoli peclja. Muha je srednja do velika. Pecelj je kratek in se loči od rastline. Kožica ploda je rumena, tanka in hitro počni. Na otip je plod zelo mehak. Meso je srednje oranžno in okoli $\frac{3}{4}$ notranjosti ploda, ki ima 5 ali več prekatov, perikarp je srednje debel (6-8 mm), semena je malo do srednje, stržen peclja je zelo plitev.

Plodovi so srednje izenačeni, zelo mehki, zato jih moramo obirati nežno in jih pazljivo zlagati v embalažo. Kožica pogosto poka. Najbolje jih je obrati še preden so povsem zreli. Listi se zvijajo. Odpornosti niso znane.

Plod je zelo sočen in srednje mesnat. Okus je neizrazit, skoraj brez kislin. Plodovi so primerni predvsem za presno uporabo.

