



8. 2. 2016

Tehnološko navodilo 1/2016 – maline

Rez malin

V kolikor še niste porezali malin, opravite to čim prej.

- a) Enkrat rodne (tulameen, mekeer,..): prikrajšajte poganjke na 2 do 4 brste nad zgornjo žico cm in jih preređite do gostote cca 15 - 20 cm med poganjki. V bujnejšem nasadu pustimo 5 poganjkov, v šibkejšem pa 8 poganjkov na tekoči meter. Odstranimo tanjšje in najdebelejšje poganjke in jih takoj odstranimo iz nasada. Najkakovostnejši poganjki so debeline 10 – 15 mm. Poganjke privežemo ob žice.
- b) Dvakrat rodne maline: zaradi bujnosti in doseganja boljše kakovosti plodov na letošnjih poganjkih, najpozneje do konca januarja porežemo rozge, ki so rodile v lanskem letu do tal. Vse porezane poganjke takoj iznesemo iz nasada. Ko začnejo izraščati letošnji poganjki, jih skrbno redčimo na 12 do 15 poganjkov na tekoči meter. Pri robustnejših sortah v bogato založenih tleh naj bo število poganjkov manjšje.

V obeh primerih svetujemo, da nasad zaščitite s sredstvi, ki vsebujejo baker. Ker pri nas v pridelavi malin še nimamo dovoljenega nobenega bakrenega fitofarmaceutskega sredstva, lahko uporabite foliarna gnojila, ki vsebujejo baker: LabiCuper (dovoljen tudi v eko), Coptrel, ..

Gnojenje

Z pridelkom 1000 kg/10 arov odnesemo iz nasada v obliki čistih hranil: cca 5 kg dušika, 2 kg fosforja in 8 kg kalija. Malinam najbolj ustrezajo organska gnojila v obliki kompostiranega hlevskega gnoja (do 3.000 kg/10 arov). Uporabite lahko tudi industrijsko pripravljena organska gnojila: bioorganik, stalatico, briketirani hlevski gnoj, ...pri uporabi upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo. V kolikor niste gnojili v jesenskem času, potem vsa organska gnojila posujte po celotni površini nasada konec februarja oziroma v začetku marca. V kolikor boste gnojili z namakanjem, upoštevajte pri izračunu porabe odvzem z pridelkom. Korenine prično z rastjo pri T nad 8 °C.

Tisti, ki gojite maline na zastirki (folija, agrotekstil), rastline dognojite z mineralnimi gnojili po celi površini, ali s počasi sproščujočimi gnojili ob sadilnih mastih ali preko namakalnega sistema. Dodajanje hlevskega gnoja v medvrstni prostor sicer doprinese k prehranjenosti rastlin posajenih na folijo, vendar učinek ni enak kot v nasadih brez zastirke.

Pripravila skupina za pridelavo jagodičja