

Sortni poskus/Variety trial
Rakičan

Prejšnji posevek: ozimna pšenica

Datum setve: 24.09.2008

Setvena količina: 20 kg/ha, medvrstna razdalja 15 cm

Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 6 m²

Gnojenje v drugem letu rabe: 195 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

Število košenj: 4 (10.05., 22.06., 23.07., 14.09.), 23.07. čistilna košnja

Navadna pasja trava/Cocksfoot
Dactylis glomerata

Previous crop: winter wheat

Date of sowing: 24.09.2008

Seed rate: 20 kg/ha, interrow spacing 15 cm

Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 6 m²

Fertilization in second year: 195 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O

Number of cuttings: 4 (10.05., 22.06., 23.07., 14.09.), 23.07. sanitary cutting

SORTA VARIETY	Izvor Origin	Prezimitev Winter hardiness	Višina rastlin 1 košnje Plant height 1st cut	Splošni vtis General impression	Odpornost proti boleznim Resistance to disease	SB/CP		NEL/NEL		2010		2009 - 2010	
						Vsebnost Contents	Pridelek Yield	Vsebnost Contents	Pridelek Yield	Pridelek zelenja Herbage yield	Rodnostna skupina Yield category	Povprečni pridelek zelenja Average herbage yield	Povprečna relativna vrednost pridelka zelenja Average relative herbage yield
		1-9 1=zelo dobra very good	cm	1-9 1=zelo dobra very good	1-9 1=zelo dobra very good	g/kg SS g/kg DM	kg/ha	MJ/kg SS MJ/kg DM	000 MJ/ha	t/ha (SS) t/ha (DM)		t/ha (SS) t/ha (DM)	%
Trerano	D 34	1,0	84	1,0	2,7	142	1834	5,72	73,8	12,91	II/1	9,49	105
Ereva	F 8	1,0	89	2,0	4,3	121	1442	5,67	67,8	11,96	II/2	8,62	96
Bepro	PL 6	1,0	82	1,0	2,7	133	1530	5,75	66,3	11,52	II/3	8,92	99
Povprečje/Mean										12,13		9,01	100
LSD (0,05)										0,92			

do leta 2009 so bili pridelki izraženi v sušini, določeni s sušenjem pri 60°C (približno 925 gSS/kg)

before 2009 the yields were expressed in dry matter, determined by drying at 60 °C (about 925 gDM/kg)