

Občutljivost sort krompirja na herbicid metribuzin/Sensitivity of potato varieties to herbicide metribusine

Prejšnji posevek: ozimna pšenica

Gnojenje: 156 kg/ha N, 96 kg/ha P₂O₅, 176 kg/ha K₂O

Datum saditve: 08.05.2009

Gostota saditve: 75 cm x 35 cm, 4 rastline/m²

Zasnova poskusa: 1 ponovitev, 1 vrsta po 8 rastlin na odmerek

Datum škropljenja/date of spraying: 12.6.2009

Datum ocene poškodb/evaluation date: 17.6.2009

Škropljenje/*Spraying*:

herbicidi/*herbicides*

fungicidi/*fungicides*

insekticidi/*insecticides*

Stomp 400 SC 2 l/ha, Platen WG 41,5 1,5 kg/ha

Acrobat MZ 2,5 kg/ha (2x), Melody duo WP 66,8 2,5 kg/ha,

Bravo 500 SC 2,5 l/ha, Infinito 1,5 l/ha (2x), Shirlan 500 SC 0,4l/ha (2x)

Calypso SC 480 0,05 l/ha, Actara 25 WG 0,06 kg/ha, Force 1,5 G 6 kg/ha

Previous crop: winter wheat

Fertilization: 156 kg/ha N, 96 kg/ha P₂O₅, 176 kg/ha K₂O

Date of planting: 08.05.2009

Planting density: 75 cm x 35 cm, 4 plants/m²

Trial layout: 1 repetition, 1 row of 8 plants per dosis

SORTA VARIETY	Odmerek Dosis	Odmerek Dosis
	0,75 l/ha	1,5 l/ha
Adora	5	
Arturia	0	1
Belana	1	5
Bellarosa	0	3
Desiree	0	3
Elfe	0	2
Frisia	2	5
Jelly	1	4
KIS Sora	1	5
KIS Sotla	0	0
Labela	0	1
Madeleine	0	1
Maris Bard	0	1
Monaco	3	5
Red Fantasy	5	7
Sante	3	5
Tabea	0	1

Legenda/Legend:

0 - ni vidnih poškodb/no damage

1 - razbarvanje posameznih lističev/discoloration of leaflets

3 - poškodbe na posameznih lističih/affected only leaflets

5 - prizadeti celi listi/whole leaves damaged

7 - poškodovana stebela/whole stems affected

9 - poškodovana cela rastlina/whole plant affected