

Občutljivost na krompirjevo plesen na listih/Susceptibility to late blight on leaves

Prejšnji posevek: ozimna pšenica
 Gnojenje: 156 kg/ha N, 96 kg/ha P₂O₅, 176 kg/ha K₂O
 Datum saditve: 08.05.2009
 Gostota saditve: 75 cm x 35 cm, 4 rastline/m²
 Zasnova poskusa: 1 ponovitev, 2 vrsti po 8 rastlin
 Škropljenje/Spraying:
 herbicidi/herbicides
 insekticidi/insecticides

Stomp 400 SC 2 l/ha, Platen WG 41,5 1,5 kg/ha
 Calypso SC 480 0,05 l/ha, Actara 25 WG 0,06 kg/ha

Previous crop: winter wheat
 Fertilization: 156 kg/ha N, 96 kg/ha P₂O₅, 176 kg/ha K₂O
 Date of planting: 08.05.2009
 Planting density: 75 cm x 35 cm, 4 plants/m²
 Trial layout: 1 repetition, 2 rows of 8 plants

SORTA VARIETY	Občutljivost na listih Susceptibility on leaves	SORTA VARIETY	Občutljivost na listih Susceptibility on leaves
Adora	2	KIS Mirna	2
Agria	4	KIS Sora	6
Anuscha	5	KIS Sotla	4
Arinda	2	Labela	1
Arrow	2	Laura	4
Arturia	4	Madeleine	4
Bellarosa	5	Marabel	2
Bellini	3	Maris Bard	1
Bistra	2	Matador	3
Carlingford	5	Minerva	1
Carrera	2	Monaco	2
Desiree	5	Mozart	5
Elfe	3	Murato	1
Escort	8	Pšata	5
Fabiola	4	Red Fantasy	5
Fabula	6	Riviera	1
Faluka	2	Romano	5
Fianna	5	Sante	5
Fianna	2	Stirling	7
Frisia	3	Sunset	7
Husar	4	Tabea	2
Jelly	7	Tosca	4
Kennebec	3	Virgo	2

Legenda/Legend:

- 1 - občutljiva/susceptible
 9 - odporna/resistant

Ocenjevanje okužbe krompirjevke s krompirjevo plesnijo po Henflingu (1982)

Assessing of late blight infection on foliage according to Henfling (1982)

% plesni	Ocena	Opis simptomov
0	1	Ni znakov plesni. / No symptoms of late blight.
0,1-1	1	Zelo malo rastlin z lezijami na večjih parcelah. Ne več kot 2 leziji na 10 m vrste (+- 30 rastlin).
1,1-3	2	Do 10 malih lezij na rastlino.
3,1-10	3	Do 30 malih lezij na rastlino ali napaden največ 1 od 20 lističev.
10,1-24	4	Večina rastlin je vidno napadenih, vsak tretji listič kaže znake okužbe. Le malo večkratnih okužb na listič.
25-49	5	Skoraj vsak listič z lezijami. Večkratne okužbe lističev so pogoste. Polje ali parcela izgleda zeleno, vendar so vse rastline okužene.
50-74	6	Vse rastline so okužene in pol listne mase je zaradi plesni uničene. Parala izgleda mešano zeleno rjava, plesen je zelo očitna.
75-90	7	Vse rastline so okužene, le da je uničene tri četrtine listne površine. Spodnji poganjki so popolnoma uničeni in odpadli, edini zeleni listi (če sploh so) so na vrhu rastlin. Oblika rastlin zaradi izgube listov postane bolj zavita. Izgled parcele ni ne rjav ne zelen.
91-97	8	Nekateri listi in večina stebel je še zelenih. Parcelsa je rjava z zelenimi lisami.
97,1-99,9	9	Ostalo je malo zelenih listov, na skoraj vseh so prisotne lezije plesni. Mnogo okužb na steblih. Parcelsa izgleda rjava.
100	9	Vsi listi in stebla so mrtvi. / All leaves and stems dry due to late blight.

Ocenjevanje okužbe gomoljev krompirja s krompirjevo plesnijo

Assessing of late blight infection on tubers

% gomoljev s plesnijo	Ocena	Opis simptomov
0	1	Ni znakov plesni na gomoljih / no symptoms on tubers
100	1	Vsi gomolji z znaki plesni / all tubers with symptoms