

INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

Hladno vreme v februarju in marcu je pridelovalcem vrtnin onemogočalo delo na prostem, v zadnjem obdobju pa je svoje dodala še obilna namočenost tal. Na območju osrednje Slovenije so s sajenjem in setvijo vrtnin na prosto začeli v zadnjih dneh marca, zgodnje kapusnice so začeli saditi na prosto okoli 10. aprila.

Kapusnice

Opravili smo prve preglede rastlin. Na lokacijah na območju osrednje Slovenije in Gorenjske za sedaj nismo opazili odloženih jajčec kapusove muhe, vendar lahko z otoplitvijo vremena pričakujemo začetek naleta muh in kmalu tudi odlaganje jajčec. Priporočamo pregledovanje rastlin. Kjer je izvedljivo, lahko muham preprečite dostop do rastlin in odlaganje jajčec tako, da rastline po sajenju prekrijete s kopreno. Za zatiranje kapusove muhe ni registriranega insekticida!



Slika 1: Zgodnje kapusnice prekrte s prekrivko in puščene rastline za spremljanje škodljivcev



Slika 2: Bolhači na pred kratkim posajenih kolerabica

Zatiranje bolhačev

Na sadikah kapusnic na prostem smo opazili pojave bolhačev, ponekod so populacije zelo številčne. Priporočamo pregledovanje rastlin in po potrebi zatiranje. Proti bolhačem v kapusnicah so registrirani pripravki v spodnji tabeli.

Tabela 1: Pripravki za zatiranje bolhačev na kapusnicah (stanje april 2018)

Pripravek	Odmerek L/ ha	Karenca (dni)	Uporaba
Decis 100 EC	0,063	7	zelje, cvetača, brstični ohrovt; največ enkrat v rastni dobi
Fastac 100 EC	0,075	14	zelje, brokoli, brstični ohrovt, ohrovt; največ dvakrat v rastni dobi
Karate Zeon 5 CS	0,15	redkvice: 3 cvetača, kit. zelje, rukola: 7 zelje, brstični ohrovt: 21	zelje, cvetača, brstični ohrovt; največ dvakrat v eni rastni dobi; kitajsko zelje največ enkrat
Raptol koncentrat	6	3	Kolerabica; največ dvakrat v rastni dobi

Čebulnice

Pregledali smo nekaj nasadov jesenskega česna in čebule, ki so sedaj v obdobju razvoja listne mase, spomladi sajene čebule in česni so pretežno še v fazi vznikanja oz. imajo razvitih nekaj listov, podobno tudi zgodnji por.

Za sedaj v nasadih nismo opazili znamenj naleta ali odloženih jajčec česnove oz. čebulne muhe. So pa bila v nekaterih toplejših območjih in legah na čebulnicah opažena znamenja, ki kažejo na začetek naleta porove zavrtaške. Znamenja naleta se kažejo v obliki drobnih belih pikic, nanizanih v vrsto, ki jih naredijo muhe med sesanjem rastlinskih sokov. Žuželke se hranijo nekaj dni, po tem začnejo odlagati jajčeca na liste. Odlaganje jajčec naj bi se začelo, ko je »verižica na listih« daljša od sedmih pikic (Slika 3).



Slika 3: Znamenja naleta porove zavrtaške

Kjer omenjenih znamenj še ne opazite ali rastline šele vznikajo, lahko z nameščanjem prekrivk preprečite muham dostop do rastlin in odlaganje jajčec. Če presajete sadike, namestite prekrivko takoj po presajanju.

Kjer prekrivanje ni izvedljivo je priporočljiva raba insekticida kak dan po začetku odlaganja jajčec. V česnu in šalotki je za zatiranje čebulne muhe in porove zavrtaške registriran insekticid Perfekthion (a.s.dimetoat) v odmerku 0,6 l/ha (največ 2 tretiranja). V čebuli, šalotki in česnu je za zatiranje raznih grizočih in sesajočih žuželk registriran insekticid Karate zeon 5 CS (a.s. lamda-cihalotrin) v odmerku 0,15 l/ha (največ 2 tretiranja).

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt