

HERBICIDI ZA ŽITA

Iz registra FFS, marec 2019

Pripravek aktivna snov	Odm. kg,l/ha	Uporaba	Čas rabe BBCH	Zatiranje
Alliance diflufenican + metsulfuron- metil	0,1	P, J, R,T	13-29	Enoletne in večletne <u>širokolistne pleveli</u> : vijolico, jetičnik, mrtvo koprivo, kamilico, njivsko spominčico, poljski mak, rosnico, zebnat, navadno zvezdico, njivski mošnjak, navadno ogrščico, krvomočnico, plezajočo lakoto, modri glavinec, navadni srakoperec.
Alister grande diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	0,8	P, T	do 28	Enoletne <u>ozkolistne in širokolistne pleveli</u> : oljno ogrščico, navadni plešec, belo metliko, plezajočo lakoto, mrtvo koprivo, kamilice, navadno zvezdico, jetičnike, njivsko vijolico, navadni srakoperec.
Alister new diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	1,0	P	12-29	<u>Ozkolistne in širokolistne pleveli</u> : plezajočo lakoto, kamilice, navadno zvezdico, jetičnike, latovke, poljski mak, ljuljke, njivski lisičji rep, krvomočnico idr.
Ally SX metsulfuron- metil	0,03	P, J, R, T, O	12-39	Enoletne <u>širokolistni pleveli</u> ; tudi v piri: navadno ogrščico, navadni plešec, belo metliko – do štirih pravih listov, navadni zebnat, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, kamilice, poljski mak, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivski mošnjak, perzijski jetičnik, njivsko vijolico, breskovolistno dresen; Najboljše delovanje, ko imajo pleveli 2-6 listov.
Arrat dikamba + tritosulfuron	0,2	P, J, JP, JJ	13-30	<u>Enoletne in večletne širokolistne pleveli</u> : pasjo kamilico, navadni plešec, belo metliko, njivski osat, oplotni slak, njivski slak, navadno rosnico, plezajočo lakoto, mrtvo koprivo, pravo kamilico, njivski mak, njivsko gorjušico, navadno škrbinko, navadno zvezdico, bršljanovolistni jetičnik, perzijski jetičnik in drugo. Za izboljšanja delovanja je priporočljivo dodajanje močila.
Axial one florasulam + pinoksaden	1	P, J, JP, JJ	13- 37	Enoletne <u>širokolistne in ozkolistne pleveli</u> : plezajočo lakoto, kamilice, nav. plešec, navadno zvezdico, nj. spominčico, poljski mak, njivsko gorjušico, njivski mošnjak, samoniklo oljno ogrščico, nav. srakoperec, ljuljke, gluhi oves, njivski lisičji rep. Zatiranje širokolistnih pl., ko je prvi list razgrnjen, do začetka oblikovanja stranskih poganjkov; trav: od treh listov do

				sredine razraščanja oz. do začetka kolenčenja (Navodila!)
Axial pinoksaden	0,6-1,2	P, J, JJ	13-39	Enoletne <u>ozkolistne plevle</u> : gluhi oves, navadni srakoperec, ljuljke in njivni lisičji rep.
Atlantis star jodsulfuron+ mezosulfuron+ tienkrabazon- metil	0,2- 0,33	P, T	13-32	Za zmanjševanje zapleveljenosti s srakopercem, latovkami in <u>enoletnimi širokolistnimi plevli</u> : navadni plešec, kamilice, poljski mak, navadna zvezdica, jetičnik, njivska vijolica, mrtva kopriva in nekatere <u>ozkolistne plevle</u> : njivski lisičji rep, ljulka, stoklasa, gluhi oves.
Biathlon 4D florasulam + tritosulfuron	0,07	P, J, R, T, O	13-39	<u>Enoletne in večletne širokolistne plevle</u> : plezajočo lakoto, pasje kamilice, oljno ogrščico, navadni plešec, njivsko redkev, njivski mošnjak, njivsko gorjušico, modri glavinec, njivsko spominčico, mak, srhodlakavi ščir, navadno zvezdico, grašice, njivski slak; - za zmanjševanje zapleveljenosti s škrlatnordečo mrtvo koprivo, metlikami, breskovo dresnijo in njivskim osatom; Možna tudi raba v piri in trdi pšenici. Pri uporabi po FF 30 je lahko učinkovitost slabša.
Basagran, Basagran 480 bentazon	2,0	P, J, R, T, O	12-30	<u>Enoletne in nekateri večletne širokolistne plevle</u> : njivsko pasjo kamilico, navadni plešec, ščavjelistno dresen, metlike, pasje zelišče, njivsko redkev, njivski mošnjak, kamilice in belo gorjušico; slabše zatira navadni slakovec, dresni, samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivsko spominčico in plezajočo lakoto; ne zatira zadovoljivo poljskega maka in jetičnika.
Bizon diflufenikan + florasulam * penoksulam	1	P, J, R, T	11-23	<u>Enoletni širokolistni plevel</u> in navadni srakoperec.
Bonaca fluksipir	0,6-0,8	P, J	12-39	<u>Enoletne in nekatere večletne širokolistne plevle</u> : plezajoča lakota, navdna zvezdica, njivski slak, navadni slakovec, bršljanolistni jetičnik.
Boudha metsulfuron- metil + tribenuron-metil	0,02	P, J, R, T, O	21-39	<u>Enoletne širokolistne plevle</u> : navadni plešec, škrlatnordeča mrtva kopriva, poljski mak, navadna zvezdica in njivska vijolica. Za zmanjševanje zapleveljenosti z belo metliko in navadnim slakovcem.
Cliophar 600 SL klopiralid	0,16- 0,2	P, J	21-31	Enoletne in večletne <u>širokolistne plevle</u> , zlasti kamilice, njivsko pasjo kamilico, osate in bodiče.
Corida tibenuron-metil	0,02	P, J, JP, JJ	31-39	<u>Širokolistne plevle</u> : škrlatna rdeča kopriva, poljski mak, navadni slakovec, njivska gorjušica, bela metlika, kamilica.
Duplosan KV mekoprop – P	2	P, J, JP	13-31	<u>Širokolistne plevle</u> : navadni plešec, njivski mošnjak, navadno zvezdico, gorjušice, jetičnike, plezajočo lakoto, njivsko redkev, navadno rosnico, poljski mak, njivsko spominčico, njivsko zlatico, in druge; zadovoljivo zatira v ugodnih

				razmerah metlike, njivski osat, njivski slak, navadni plotni slak, modri glavinec, navadni slakovec, njivsko mrtvo koprivo, njivsko vijolico in druge. Semenski pleveli so najbolj občutljivi v stadiju 2-6 listov, koreninski morajo biti večji: osat visok vsaj 15 cm, ščavje pa vsaj 20 cm, plezajoča lakota je najbolj občutljiva do razvitih 6-8 etaž.
Ergon metsulfuron- metil + tifensulfuron- metil	0,06- 0,07	P, JP, JJ	12-39	Enoletne in večletne <u>širokolistne plevele</u> : navadni plešec, belo metliko, navadni slakovec, plezajočo lakoto, navadni zebkrat, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, kamilice, njivsko spominčico, poljski mak, ptičjo dresen, navadno zvezdico, perzijski jetičnik, njivsko vijolico. Ni za dutum pšenico; ko imajo pleveli 2 do največ 6 listov.
Esteron 2,4-D 2-EHE	0,75- 1,0	P, J, T, JP	22-32	Nekatere enoletne <u>širokolistne plevele</u> : navadni plešec, njivski osat, njivski slak, navadno rosnico, poljski mak, navadni slakovec, breskove dresen, njivske gorjušice, pasje zelišče, perzijski jetičnik, srhkodlakavi ščir, bela metlika, veliki trpotec, ptičja dresen, ščavje listna dresen in druge.
Finy metsulfuron- metil	0,03	P, J, T	23-39	<u>Enoletne širokolistne plevele</u> : bršljanastolistni jetičnik, navadna zvezdica, nedišeča trirobka, njivska gorjušica, njivska vijolica, perzijski jetičnik, plezajoča lakota, poljski mak, prava kamilica, škrlatnordeča mrtva kopriva.
Flame tibenuron-metil	0,03	P, J, JJ	13-39	<u>Širokolistne plevele</u> : navadna zvezdnica, navadni repnjakovec, samonikla oljna ogrščica, poljski mak, nedišeča trirobka, njivska spominčica, njivska gorjušica in druge.
Flurostar 200 fluksipir	0,75- 1,0	P, J, R, T, JJ, JP	13-31; jarine 12-39	Za zatiranje plezajoče lakote in drugih vrst <u>enoletnega širokolistnega plevela</u> .
Granstar super 50 SX tifensulfuron- metil+ tribenuron-metil	0,06	P, J, R, T, O	17-32	<u>Širokolistne plevele</u> : belo metliko, navadni slakovec, njivsko vijolico in navadno zvezdico; zmanjšuje zapleveljenost z njivsko spominčico in navadno lobodo in omejeno deluje na plezajočo lakoto. Optimalen čas rabe, ko imajo pleveli razvite od 2 do 4 liste in intenzivno rastejo.
Grodyl amidosulfuron	0,04	P, J, R, T, O	13-37	<u>Širokolistne plevele</u> , tudi v piri; dobro zatira navadni ščir, plezajočo lakoto, njivsko gorjušico, navadni slakovec, kamilice, navadni plešec, njivsko spominčico, kodrastolistno kislico; slabše deluje na škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivsko vijolico, perzijski jetičnik, navadno rosnico.
Hussar OD jodosulfuron- metil-natrij	0,1	P, J, R, T	21-37 oz. 13- 29	Enoletne <u>širokolistne in ozkolistne plevele</u> : navadni srakoperec, ljuljke, enoletno latovko, kurjo češnjico, pravo kamilico, navadni plešec, modri glavinec, plezajočo lakoto, njivsko spominčico, poljski mak, dresen, njivsko zlatico, njivsko redkev, kislico, grint, njivsko gorjušico, škrbinko, navadno zvezdico, vijolico in druge.

Hussar plus jodosulfuron- metil-natrij + mezosulfuron	0,15- 0,2	P,R, T; JJ	13-32; jarine 13-30	Enoletni <u>širokolistne in ozkolistne plevele</u> : navadni srakoperec, ljuljke, enoletno latovko, ogrščico, navadni plešec, plezajočo lakoto, krvomočnico, pravo kamilico, njivsko spominčico, poljski mak, navadno zvezdico, mrtvo koprivo idr.
Lontrel 100 klopiralid	1-1,2	P	21-31	<u>Širokolistne plevele</u> : bodiče, kamilice, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov.
Lontrel 72 SG klopiralid	0,17	P, J, O	21-31	<u>Širokolistne plevele</u> : kamilice, nedišeča trirobka, osati.
Mezzo metsulfuron- metil	0,02- 0,03	P, J, T, O	13-39	Enoletni in večletni <u>širokolistne plevele</u> .
Mustang 306 SE 2,4-D 2-EHE + florasulam	0,4-0,6	P, J, JP	21-31	Enoletne <u>širokolistne plevele</u> : navadno zvezdico, navadna kurja črevca, pravo kamilico, plezajočo lakoto, pelinolistno ambrozijo; za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom, njivskim osatom, njivskim slakom
Pallas 75 WG piroksulam	0,12- 0,25	P, R, T	12-32	<u>Ozkolistne in širokolistne plevele</u> : navadno zvezdico, jetičnike, navadni srakoperec, pasjo kamilico, navadni plešec, njivsko gorjušico, vijolice, njivski lisičji rep, plezajočo lakoto, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, ljuljke
Saracen max florasulam + tribenuron-metil	0,025	P, J, R, O, T	12-39; jarine 12-32	<u>Zatira</u> : njivsko gorjušico, plezajočo lakoto, navadno zvezdico, poljski mak, navadni mošnjak, navadni steničnjak, njivsko spominčico, navadni zebrat, ptičjo dresen, nedišečo trirobko, navadnega plešča, samoniklo oljno ogrščico. <u>Zmanjšuje zapleveljenost</u> : navadnega slakovca, njivske vijolice, bele metlike, breskove dresni.
Savvy metsulfuron- metil	0,03	P, J,T,O	13-37	Enoletne in večletne <u>širokolistne pleveli</u> : navadni plešec, navadni zebrat, škrlatno rdečo mrtvo koprivo, kamilice, njivsko spominčico, poljski mak, dresni, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, perzijski jetičnik, njivsko vijolico.
Sekator OD jodosulfuron- metil-natrij + amidosulfuron	0,1- 0,15	P, J, R, T	25-32	Enoletne <u>širokolistne plevele</u> , nekatere ozkolistne in večletne plevele; posebej dobro zatira navadni plešec, glavinec, metlike, zebrat, plezajočo lakoto, kamilice, poljski mak, navadno zvezdico, njivski mošnjak. Zaviralno deluje zoper njivski osat, mrtvo koprivo, dresni, vijolico in jetičnik.
Starane forte fluroksipir	0,54	P, J, R, T,O	21-32	Nekatere <u>širokolistne plevele</u> , tudi v piri.
Stomp aqua pendimetalin	2,9	P, J, R, T, JJ	do 30; jarine	Enoletne <u>ozkolistne</u> in nekatere <u>širokolistne plevele</u> . Učinkovito zatira: enoletno latovko, navadno zvezdico, navadno lobodo, poljski mak, belo metliko, njivsko spominčico, njivsko vijolico, ptičjo dresen, škrlatnordečo mrtvo koprivo,

			pred 9	njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče, samoniklo oljno ogrščico. Slabše zatira: navadno latovko, navadno rosnico, navadni plešec, ter kamilico.
Tandus 200 EC fluroksipir	0,75- 2,0	P, J, R, T,O	13-39	Nekatere <u>širokolistne plevele</u> .
TBM 75 WG tribenuron-metil	0,02	P, J, R, T,O	12-33	Enoletne <u>širokolistne plevele</u> : navadno zvezdico, njivsko gorjušico, navadni plešec, poljski mak, ptičjo dresen; tudi belo metliko, modri glavinec, škrlatnordečo mrtvo koprivo in pravo kamilico.
U 46 M-fluid MCPA – DMA	1,0	P, J, R, T	23-39	Enoletne in večletne <u>širokolistne plevele</u> : navadni plešec, njivski slak, preslico, navadno rosnico, krvomočnico, ločje, njivsko mrtvo koprivo; zaviralno deluje na poljski mak, trpotec, zlatico in jetičnik.
P-pšenica, J-ječmen, R-rž, T-tritikala, O-oves; JJ jari ječmen, JP jara pšenica BBCH razvojni stadiji: 13-29 = od tretjega lista do konca razraščanja; 30 = začetek kolenčenja; 37 = viden vrhni list (zastavičar); 39 = zastavičar razvit				