

TABELA: HERBICIDI ZA SPOMLADANSKO ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH

Pripravki aktivna snov	Odmerek (kg, l/ha)	Registracija in čas rabe	Pleveli * (legenda)
Adentis, Corida, Flame, tribenuron-metil	0,02	P, J od prvega kolena in najpozneje do zastavičarja (BBCH 31-39)	EŠ
Alister new diflufenikan + jodosulfuron + mezosulfuron	1	P zgodaj spomladi, od dveh listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)	Š in O
Alliance diflufenikan + metsulfuron metil	0,1	P, J po vzniku, od prvega lista do konca razraščanja (BBCH 10-29)	EŠ
Ally SX, Finy, Savvy metsulfuron-metil	0,03	P, J, Pi, O, R, T jara ž.: od drugega lista do zastavičarja (BBCH 12-39); oz. ž.: od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21-39)	EŠ
Arrat dikamba + tritosulfuron	0,2	P, J	Š
Atlantis star jodosulfuron + mezosulfuron + tienkarbazon-metil	0,2–0,33	P, T od treh listov do drugega kolena (BBCH 13-32)	O in Š
Axial pinoksaden	0,6–1,2	P, J od treh listov do zastavičarja (BBCH 13-39)	EO
Axial one florasulam + pinoksaden	1–1,3	P, J od prvega lista do faze, ko je viden zastavičar (BBCH 11-37)	Š in O
Basagran 480 bentazon	2,0	P, J, O, R, T od razraščanja do začetka kolenčenja (BBCH 21-31)	Š
Biathlon 4D florasulam + tritosulfuron	0,07	P, J, Pi, R, T od tretjega lista do razvitega zastavičarja (BBCH 13 do 39)	Š
Boudha metsulfuron + tribenuron	0,02	P, J, R, T (O: manjše uporabe) od razraščanja in najpozneje do zastavičarja (BBCH 21-39)	EŠ
Flurostar 200, Starane forte, Tandus 200 EC fluroksipir	0,6–0,8	P, J, R, T od dveh razvitih l. do zastavičarja (BBCH 12-39)	EŠ in VŠ
Clyde FX, Flurostar super florasulam + fluroksipir	1,5	P, J, O, R, T od šest stranskih poganjkov do zastavičarja (BBCH 26-39)	Š
Valentia florasulam + fluroksipir	1,2–1,6	P, J, O, R, T od treh listov do pozne faze nabrekanja l. nožn. (BBCH 13-45)	Š
Corello duo florasulam + piroksulam	0,170– 0,265	P, Pi, R, T od začetka razraščanja do faze prvega kolena (BBCH 21-31)	O in Š
Flyer florasulam	0,1–0,15	P, J, R od treh razvitih listov do zastavičarja, (BBCH 19-39)	Š
Duplosan KV mekoprop – P	2,0	P, J, od razraščanja do kolenčenja (BBCH 21-31)	Š
Duplosan KV 600 mekoprop – P	1,5	P, J, O, R, T med razraščanjem žit (BBCH 13-29)	
U 46 M-Fluid MCPA-DMA	1,0	P, J, R, T od 3 stranskih poganjkov do zastavičarja (BBCH 23 - 39)	EŠ, VŠ
Esteron 2,4-D 2-EHE	0,75–1,0	P, J, T od konca razraščanja do drugega kolena (BBCH 22-32)	EŠ
Grodyl amidosilfuron	0,04	P, J, Pi, O, R, T od treh listov do začetka pojavljanja zgornjega lista (BBCH 13-37)	Š
Herbocid XL 2,4-D	1,25	P, J, R, T od sredine razraščanja do konca razraščanja (BBCH 24-29)	EŠ in VŠ
Hussar OD jodosulfuron	0,2	P, J, R, T od faze treh listov do drugega kolena (BBCH 13–32)	EŠ in VŠ
Hussar star jodosulfuron + tienkarbazon- metil	0,2–0,3	P, R, T od začetka razraščanja do drugega kolena (BBCH 21-32)	EŠ in EV

Lector delta diflufenikan + florasulam	0,075– 0,1	P, J, R, T od začetka razraščanja do drugega kolena (BBCH 21-32)	Š
Mustang 306 SE 2,4 D + florasulam	0,4–0,6	P, J, T od začetka razraščanja do prvega kolena (BBCH 21-31)	EŠ
Mustang forte 2,4 D + aminipiralid + florasulam	0,8–1,0	P, J, O, R, T od začetka razraščanja do drugega kolena (BBCH 21-32)	Š
Pallas 75 WG piroksulam	0,12 – 0,25	P, R, T od faze dveh listov do drugega kolena (BBCH 12-32)	O in Š
Quelex flurasulam + halauksifen-metil	0,05	P, J, Pi, R, T spomladi od faze začetnega razraščanja do faze drugega kolena (BBCH 21-32)	Š
Sekator OD amidosulfuron + jodosulfuron	0,15	P, J, R, T ozimna ž.: tretji list do začetka razv. zastavičarja (BBCH 13-37); jara ž.: tretji list do konca razraščanja (BBCH 13-29)	EŠ, EO in VŠ
Sekator plus 2,4-D + amidosulfuron + jodosulfuron	0,6	P, J, R, T	Š
Xanadu bensulfuron + metsulfuron	0,1	P, J, O, R, T ozimna ž. : od začetka razraščanja do zastavičarja (BBCH 21-39); jara ž.: od tretjega lista do zastavičarja (BBCH 13-39)	Š

*P-pšenica, J-ječmen, Pi-pira, O-oves, R-rž, T-tritikala

Š-širokolistni, O-ozkolistni, EŠ-enoletni širokolistni, EO-enoletni ozkolistni, VŠ-večletni širokolistni

Besedilo: Meta Urbančič Zemljič

Kmetijski inštitut Slovenije

20. 3. 2023