

Sortni poskus/Variety trial
Maribor

Prejšnji posevek: oljna ogrščica

Gnojenje: 125kg/ha N (v 4 obrokih), 10 kg/ha P₂O₅, 150 kg/ha K₂O

Škropljenje: Sekator 75 WG 0,125 g/ha, Mustang 306 SE 0,6 l/ha, Seguris extra 0,6/ha, Poleci 0,25 l/ha

Gostota setve: medvrstna razdalja 12,5 cm, 400-750 kalivih zrn/m²

Setev: 28.10.2016, vznik: 15.10.2016, žetev: 20.07.2017

Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 7,5 m²

Ozimna rž/Winter rye

Previous crop: winter oilseed rape

Fertilization: 125 kg/ha N (in 4 rations), 100 kg/ha P₂O₅, 150kg/ha K₂O,

Spraying: Sekator 75 WG 0,125 g/ha, Mustang 306 SE 0,6 l/ha, S

Seguris extra 0,6/ha, Poleci 0,25 l/ha

Sowing density: interrow spacing 12.5 cm, 400-750 germinative seeds/m²

Sowing: 31.10.2016, emergence: 15.10.2016, harvesting: 20.07.2017

Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 7,5 m²

SORTA VARIETY	Datum klasitve Date of earing	RASILINA/PLANT		ANALIZA/ANALYSIS				PRIDELEK/YIELD			BOLEZEN/DISEASE				
		Višina Height	Poleg po klasitvi Lodging from ear forming on	Hektolitrska masa Test weight	Absolutna masa zrnja Thousand seeds weight	Surove beljakovine Crude protein	Število padanja Falling number	Vlaga zrnja Grain moisture	Zrnje s 14% vlago Grain with 14% moisture	Rodnostna skupina Yield category	<i>Erysiphe graminis</i>	<i>Puccinia graminis</i>	<i>Puccinia recondita</i>	<i>Rhynchosporium secalis</i>	<i>Fusarium sp.</i>
		cm	1-9 1=brez/without	kg	g	%	s	%	t/ha	I	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without
Sv Forsetti	13. 5.	122	1	78	41	11,2	340	12,2	6,99	I	1	2	1	1	1
D. Opal	9. 5.	135	1	76	40	11,7	291	12,1	5,86	II/2	1	2	1	1	1
Dukato	9. 5.	132	1	78	40	12,3	300	12,1	5,60	II/3	1	3	1	1	1
D. Granat	9. 5.	134	1	78	40	13,2	267	12,5	5,59	II/3	1	2	1	1	1
Povprečje/Mean									6,01						
LSD (0,05)									0,44						