

Sortni poskus/Variety trial
Maribor

Ozimna rž/Winter rye

Prejšnji posevek: oljna ogrščica

Gnojenje: 130 kg/ha N (v 3 obrokih), 60 kg/ha P₂O₅, 120 kg/ha K₂O

Škropljenje: Boxer 6 l/ha, Mustang 0 6 l/ha, Seguris xtra 1 l/ha Amistar extra 0,8 l/ha

Gostota setve: medvrstna razdalja 12,5 cm, 230-550 kalivih zrn/m²

Setev: 27.10.2015, vznik: 12.11.2015, žetev: 21.07.2016

Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 7,5 m²

Previous crop: oiled rape

Fertilization: 130 kg/ha N (in 3 rations), 60 kg/ha P₂O₅, 120 kg/ha K₂O

Spraying: Boxer 6 l/ha, Mustang 0 6 l/ha, Seguris xtra 1 l/ha Amistar extra 0,8 l/ha

Sowing density: interrow spacing 12.5 cm, 230-550 germinative seeds/m²

Sowing: 27.10.2015 emergence: 12.11.2015, harvesting: 21.07.2016

Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 7.5 m²

SORTA VARIETY	Datum klasitve Date of earing	RASTLINA/PLANT		ANALIZA/ANALYSIS				PRIDELEK/YIELD			BOLEZEN/DISEASE				
		Višina Height	Poleg po klasitvi Lodging from ear forming on	Hektolitrska masa Test weight	Absolutna masa zrnja Thousand seeds weight	Surove beljakovine Crude protein	Padno število	Vlaga zrnja Grain moisture	Zrnje s 14% vlago Grain with 14% moisture	Rodnostna skupina Yield category	<i>Erysiphe graminis</i>	<i>Puccinia graminis</i>	<i>Puccinia recondita</i>	<i>Rhynchosporium secalis</i>	<i>Fusarium sp.</i>
		cm	1-9 1=brez/without	kg	g	%	s	%	t/ha		1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without	1-9 1=brez/without
Brossetto	11. 5.	133	1	77	34	8,7	376	13,1	7,24	II/1	1	1	1	2	1
Bono	11. 5.	133	1	78	31	8,5	343	13,2	6,82	II/2	1	1	1	2	1
Dankowsky Amber	8. 5.	152	1	76	35	10,0	325	12,9	6,65	II/2	1	1	1	2	1
Dankowsky Diamant	8. 5.	150	1	77	35	9,8	347	12,9	5,77	II/3	1	2	1	2	1
Elego	10. 5.	159	1	75	34	8,4	344	13,3	5,71	II/3	1	2	1	2	1
Povprečje/Mean									6,44						
LSD (0,05)									0,86						