

Sortni poskus/Variety trial
Maribor

Ozimna tritikala/Winter triticale

Prejšnji posevek: oljna ogrščica

Gnojenje: 130 kg/ha N (v 3 obrokih), 60 kg/ha P₂O₅, 120 kg/ha K₂O

Škropljenje: Boxer 6 l/ha, Mustang 0 6 l/ha, Seguris xtra 1 l/ha Amistar extra 0,8 l/ha

Gostota setve: medvrstna razdalja 12,5 cm, 230-550 kalivih zrn/m²

Setev: 27.10.2015, vznik: 12.11.2015, žetev: 21.07.2016

Zasnova poskusa: naključni blok v 4 ponovitvah, osnovna parcela 7,5 m²

Previous crop: oilseed rape

Fertilization: 130 kg/ha N (in 3 rations), 60 kg /ha P₂O₅, 120 kg /ha K₂O

Spraying: Boxer 6 l/ha, Mustang 0 6 l/ha, Seguris xtra 1 l/ha Amistar extra 0,8 l/ha

Sowing density: interrow spacing 12.5 cm, 230-550 germinative seeds/m²

Sowing: 27.10.2015 emergence: 12.11.2015, harvesting: 21.07.2016

Trial layout: randomized block design in 4 repetitions, plot size 7.5 m²

SORTA VARIETY	Datum klasitve Date of earing	RASTLINA/PLANT		ANALIZA/ANALYSIS			PRIDELEK/YIELD			BOLEZEN/DISIASE				
		Višina Height	Poleg po klasitvi Lodging from ear forming on 1-9 1=brez/without	Hektolitrska masa Test weight kg	Absolutna masa zrnja Thousand seeds weight g	Surove beljakovine Crude protein %	Vlaga zrnja Grain moisture %	Zrnje s 14% vlago Grain with 14% moisture t/ha	Rodnostna skupina Yield category	<i>Erysiphe graminis</i> 1-9 1=brez/without	<i>Puccinia graminis</i> 1-9 1=brez/without	<i>Puccinia recondita</i> 1-9 1=brez/without	<i>Rhynchosporium secalis</i> 1-9 1=brez/without	<i>Fusarium sp.</i> 1-9 1=brez/without
Cosinus	12. 5.	112	1	73	39	9,6	13,3	6,69	I	1	1	1	2	1
Ragtac	16. 5.	103	1	72	41	9,8	13,0	6,54	I	1	1	1	2	1
Agostino	16. 5.	95	1	75	40	9,5	13,2	6,54	I	1	1	1	2	1
SW Talentro	13. 5.	92	1	74	43	9,6	13,2	6,07	II/2	1	1	1	2	1
Grenado	18. 5.	80	1	71	37	9,4	13,3	4,81	III	1	1	1	2	1
Bc Goran	18. 5.	94	1	73	43	9,9	13,1	4,80	III	1	1	1	2	1
Povprečje/Mean								5,91						
LSD (0,05)								0,50						